

Zadanie 0.

Do podstawowych funkcji II poziomu trójstopniowej opieki perinatalnej w Polsce NIE należy/NIE należą:

- A. promocja zdrowia,
- B. opracowywanie i prowadzenie edukacji ciągłej,
- C. edukacja ciągła,
- D. przyjęcia z poziomu opieki podstawowej i prowadzenie ciąż oraz porodów średniego ryzyka.

Zadanie 0.

"10 kroków do Udanego Karmienia Piersią" to główne założenia:

- A. programu "Szpital Przyjazny Dziecku",
- B. programu "Bezpieczne Macierzyństwo",
- C. programu Poprawy Opieki Perinatalnej w Polsce,
- D. "Szkoły Matek i Ojców Razem Łatwiej".

Zadanie 0.

Przyczynami hipotrofii noworodka mogą być:

- A. przyczyny społeczne,
- B. choroby ojca,
- C. choroby płodu,
- D. prawidłowe odpowiedzi A i C.

Zadanie 0.

Związkami dezynfekcyjnymi dopuszczanymi do stosowania w oddziałach neonatologicznych, są:

- A. alkohole (głównie etylowy, izopropylowy, n-propylowy),
- B. pochodne fenolu,
- C. aldehydy,
- D. pochodne krezolu.

Zadanie 0.

Do czynników ryzyka zakażeń wewnątrzmacicznych należą:

- A. niedojrzałość < 37 tygodnia ciąży,
- B. płeć żeńska,
- C. zakażenie układu moczowego,
- D. prawidłowe odpowiedzi A i C.

Zadanie 0.

Procesem mającym na celu usunięcie lub zabicie drobnoustrojów, który ma spowodować, że używane przedmioty będą bezpieczne dla zdrowia pacjentów, to:

- A. sterylizacja,
- B. dekontaminacja,
- C. dezynfekcja,
- D. oczyszczanie.

Zadanie 0.

W opiece nad noworodkiem przebywającym w Oddziale Intensywnej Terapii bardzo ważne jest zbudowanie dobrych relacji między personelem medycznym a rodziną dziecka. Ma to istotny wpływ na:

- A. podejmowanie przez rodziców decyzji dotyczących proponowanych zasad terapii,
- B. wzrost zaufania i porozumienia między lekarzem a rodziną,
- C. zrozumienie stanu pacjenta przez rodzinę,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.

Współczynnik umieralności okołoporodowej obejmuje m. in.:

- A. zgony płodów w czasie trwania akcji porodowej,
- B. zgony płodów przed rozpoczęciem akcji porodowej,
- C. martwe urodzenia oraz zgony noworodków do 9 doby życia włącznie,
- D. prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 0.

Określając dojrzałość noworodka w zmodyfikowanej skali Ballard oceniamy:

- A. kąt zgięcia dłoni,
- B. objaw przeskakiwania,
- C. objaw szarfy,
- D. prawidłowa odpowiedź A i C.

Zadanie 0.

Na zmniejszenie umieralności okołoporodowej w Polsce NIE ma bezpośredniego wpływu:

- A. podnoszenie poziomu wiedzy personelu medycznego oddziałów położniczych i noworodkowych,
- B. popularyzacja zdrowego stylu życia w czasie ciąży,
- C. zmniejszenie ogólnej liczby porodów,
- D. uprzywilejowanie transportu "in utero".

Zadanie 0.

Proszę wskazać na schorzenie matki predysponujące do występowania makrosomii u noworodka:

- A. nadczynność tarczycy,
- B. cukrzyca,
- C. fenylketonuria,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.

Przyczyną niedoboru surfaktantu NIE jest:

- A. przegrzanie,
- B. kwasica,
- C. hipoksja,
- D. oziębienie.

Zadanie 0.

U zdrowego noworodka, w ciągu kilkadziesiąt minut po urodzeniu, dochodzi do normalizacji oddechów. Ich częstotliwość na minutę powinna wynosić:

- A. 15 - 20,
- B. 20 - 30,
- C. 40 - 60,
- D. 60 - 80.

Zadanie 0.

Żółtaczka fizjologiczna noworodków jest spowodowana nadmiernym poziomem:

- A. bilirubiny pośredniej,
- B. bilirubiny bezpośredniej,
- C. retikulocytów w surowicy,
- D. urobilinogenu.

Zadanie 0.

Fizjologiczny spadek masy ciała u noworodka NIE powinien przekroczyć:

- A. 8% wagi urodzeniowej,
- B. 10% wagi urodzeniowej,
- C. 12% wagi urodzeniowej,
- D. 14% wagi urodzeniowej.

Zadanie 0.

Wśród bardzo niebezpiecznych klinicznych objawów krwawienia wewnątrzczaszkowego u noworodka, pielęgniarka, położna może zaobserwować:

- A. stupor, śpiączkę, zaburzenia wentylacji, uogólnione drgawki, sztywność i objawy uszkodzenia nerwów czaszkowych,
- B. śpiączkę, zaburzenia wentylacji, uogólnione drgawki, podwyższoną ciepłotę ciała, wiotkość i objawy uszkodzenia nerwów czaszkowych,
- C. stupor, śpiączkę, zaburzenia wentylacji, uogólnione drgawki, podwyższoną ciepłotę ciała, sztywność i objawy uszkodzenia nerwów obwodowych,
- D. stupor, śpiączkę, uogólnione drgawki, wiotkość i objawy uszkodzenia nerwów obwodowych.

Zadanie 0.

Przyrost dobowy u noworodka donoszonego powinien wynosić:

- A. 10 g,
- B. 30 g,
- C. 50 g,
- D. 70 g.

Zadanie 0.

Pielęgniarka, położna, która karmi noworodka przez zgłębnik powinna pamiętać o jego wymianie. Zaleca się, aby zgłębnik silikonowy założony przez nos wymieniać co:

- A. 48 - 72 godziny, a poliuretanowy co 12 - 24 godziny,
- B. 12 - 24 godziny, a poliuretanowy co 48 - 72 godziny,
- C. 12 godzin, a poliuretanowy co 24 godziny,
- D. 6 godzin, a poliuretanowy co 12 - 24 godziny.

Zadanie 0.

Przetrwały odruch szukania charakteryzuje:

- A. wiercenie się,
- B. moczenie nocne,
- C. słaba zręczność manualna,
- D. hipotonia.

Zadanie 0.

Wszystkie noworodki po urodzeniu powinny otrzymywać witaminę K, przy czym noworodki donoszone:

- A. 0,5 mg domięśniowo (i.m.) lub 2 mg doustnie (p.o.),
- B. 0,5 mg domięśniowo (i.m.) lub 1 mg doustnie (p.o.),
- C. 1 mg domięśniowo (i.m.) lub 2 mg doustnie (p.o.),
- D. 0,5 mg domięśniowo (i.m.) lub 0,5 mg doustnie (p.o.).

Zadanie 0.

Przeciwno wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, dziecko należy zaszczepić:

- A. domięśniowo dawką 0,5 ml, w środkowo - wewnętrzną część uda,
- B. domięśniowo dawką 0,5 ml, w środkowo - zewnętrzną część uda,
- C. śródskórnio dawką 0,5 ml, w środkowo - zewnętrzną część uda,
- D. podskórnio dawką 0,5 ml, w środkowo - zewnętrzną część uda.

Zadanie 0.

Bezwzględny przeciwwskazaniem do karmienia piersią, ze strony noworodka jest:

- A. fenyloketonuria,
- B. rozszczep wargi i podniebienia,
- C. choroba syropu klonowego,
- D. galaktozemia.

Zadanie 0.

Dla żółtaczkii fizjologicznej, górne stężenie bilirubiny u noworodków donoszonych, wynosi:

- A. 6 mg%,
- B. 10 mg%,
- C. 12 mg%,
- D. 15 mg%.

Zadanie 0.

Polski Zespół Ekspertów zaleca przyjmowanie kwasu foliowego jako profilaktyki wrodzonych otwartych wad cewy nerwowej, w dawce:

- A. 0,04 mg dziennie przez 3 miesiące przed planowaną ciążą i do 12 tygodnia jej trwania, natomiast dla kobiet, u których w wywiadzie są otwarte wady cewy nerwowej u dzieci 4 mg dziennie,
- B. 4 mg dziennie przez 3 miesiące przed planowaną ciążą i do 12 tygodnia jej trwania, natomiast dla kobiet, u których w wywiadzie są otwarte wady cewy nerwowej u dzieci 8 mg dziennie,
- C. 0,4 mg dziennie przez 3 miesiące przed planowaną ciążą i do 12 tygodnia jej trwania, natomiast dla kobiet, u których w wywiadzie są otwarte wady cewy nerwowej u dzieci 4 mg dziennie,
- D. 0,4 mikrograma dziennie przez 3 miesiące przed planowaną ciążą i do 12 tygodnia jej trwania, natomiast dla kobiet, u których w wywiadzie są otwarte wady cewy nerwowej u dzieci 0,4 mg dziennie,

Zadanie 0.

O głębokiej hipotermii noworodka mówimy wówczas, gdy ciepłota ciała wynosi poniżej:

- A. 37°C,
- B. 36°C,
- C. 35°C,
- D. 34°C.

Zadanie 0.

W celu wczesnej diagnostyki wrodzonej dysplazji stawów biodrowych wykonuje się badanie polegające na zastosowaniu manewru, który reponuje zwichnięte biodro, co oznacza dodatni wynik testu. Kiedy zwichnięte (podwichnięte) biodro ulega odwiedzeniu zgięte pod kątem 90 stopni, pojawia się wrażenie "kliknięcia" w momencie gdy głowa kości udowej przemieszcza się do panewki stawu biodrowego. Jest to tzw.:

- A. objaw Babińskiego,
- B. objaw Ortolaniego,
- C. objaw Ottona,
- D. żaden z powyższych.

Zadanie 0.

Różowo-czerwona plama u noworodka, spowodowana miejscowym rozszerzeniem naczyń, zlokalizowana na brzegach górnych powiek, na czole powyżej nasady nosa, na górnej wardze, na granicy głowy i karku, tuż powyżej linii owłosienia, to:

- A. plama mongolska,
- B. objaw arlekina,
- C. bociani dziób,
- D. potówki czerwone.

Zadanie 0.

Laktoperoksydaza to enzym mleka kobiecego:

- A. trawiący białka,
- B. działający bakteriostatycznie,
- C. stymulujący produkcję IgA,
- D. trawiący węglowodany.

Zadanie 0.

Mleko przedporodowe pojawia się w:

- A. 16 tygodniu ciąży,
- B. 25 tygodniu ciąży,
- C. 30 tygodniu ciąży,
- D. 37 tygodniu ciąży.

Zadanie 0.

Badanie stanu neurologicznego noworodka polega m.in. na ocenie zachowań dziecka w czterech płaszczyznach: procesy gotowości do kontaktów, procesy motoryczne, kontrola stanu fizycznego, odpowiedź na stres. Skalę tę opracował:

- A. Ballard,
- B. Brazelton,
- C. Zawitkowski,
- D. Dubovitz.

Zadanie 0.

W jakiej odległości od lamp naświetlających powinien znajdować się noworodek poddawany fototerapii?

- A. 10 - 20 cm,
- B. 20 - 30 cm,
- C. 40 - 50 cm,
- D. 60 - 80 cm.

Zadanie 0.

Stosowanie leków sedacyjnych pomaga w ustabilizowaniu stanu ogólnego noworodka podczas transportu. Wskaż stwierdzenie NIEPRAWDZIWE:

- A. do leków sedacyjnych należą; luminal, dormicum, gardenal,
- B. dormicum można stosować u wszystkich noworodków niezależnie od masy ciała i stopnia dojrzałości,
- C. nie należy stosować leków sedacyjnych u dziecka podłączonego do nCPAP,
- D. leki sedacyjne stosuje się w przypadku konieczności transportu dziecka zaintubowanego i podłączonego do sztucznej wentylacji.

Zadanie 0.

Przetrwwały odruch Galanta charakteryzuje:

- A. problem z mową,
- B. moczenie nocne,
- C. słaba zręczność manualna,
- D. hipotonia.

Zadanie 0.

O hipoglikemii noworodka donoszonego, w pierwszych trzech godzinach życia, świadczy stężenie glukozy we krwi poniżej:

- A. 50 mg/dl,
- B. 40 mg/dl,
- C. 30 mg/dl,
- D. 20 mg/dl.

Zadanie 0.

W realizacji procesu pielęgnowania nad noworodkiem po porodzie drogami natury bardzo ważne jest zapobieganie zapaleniu spojówek, wywoływanemu przez dwoinkę rzeżączki lub chlamydia. W tym celu pielęgniarka, położna powinna do 30 minut po porodzie wykonać zabieg Credego:

- A. przy użyciu 0,5% azotanu srebra i wody destylowanej lub 0,5% maści z erytromycyną lub 1% maści z tetracykliną,
- B. przy użyciu 1% azotanu srebra i wody destylowanej lub 0,5% maści z erytromycyną lub 1% maści z tetracykliną,
- C. przy użyciu 0,5% azotanu srebra i wody destylowanej lub 1% maści z erytromycyną lub 1% maści z tetracykliną,
- D. przy użyciu 1% azotanu srebra i wody destylowanej lub 0,5% maści z erytromycyną lub 0,5% maści z tetracykliną.

Zadanie 0.

Ocenę stanu noworodka po porodzie fizjologicznym według schematu V. Apgar należy przeprowadzić co najmniej:

- A. w pierwszej i drugiej minucie życia,
- B. w pierwszej i trzeciej minucie życia,
- C. w pierwszej i czwartej minucie życia,
- D. w pierwszej i piątej minucie życia.

Zadanie 0.

Mleko dojrzałe:

- A. ma obniżoną zawartość białka,
- B. jest niebieskawe, klarowne,
- C. pojawia się po 2 tygodniach od porodu,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.

W ciąży pozamaciczej stężenie hCG:

- A. w odstępie 3 dni ulega podwojeniu,
- B. w odstępie 3 dni ulega bardzo dużemu wzrostowi,
- C. w odstępie 3 dni nie zmienia się lub zmienia nieznacznie,
- D. brak prawidłowej odpowiedzi.

Zadanie 0.

Colostrum to:

- A. układ odpornościowy układu oddechowego,
- B. mleko z dużą zawartością IgA,
- C. wszystkie klasy przeciwciał,
- D. wszystkie grupy komórek odpornościowych.

Zadanie 0.

Amniopunkcja wykonana przed 15 tygodniem ciąży wiąże się z ryzykiem:

- A. poronienia,
- B. wystąpienia wad stóp,
- C. wystąpienia przepukliny płodowej,
- D. prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 0.

Przyrost masy ciała u noworodka donoszonego jest obserwowany w:

- A. 2 - 3 dobie,
- B. 3 - 4 dobie,
- C. 4 - 5 dobie,
- D. 5 - 6 dobie.

Zadanie 0.

Test potrójny jako badanie prenatalne służy wykrywaniu trisomii u płodu. W przypadku trisomii 21 stwierdza się:

- A. niski poziom AFP, niski poziom beta - hCG, niski poziom uE3,
- B. niski poziom AFP, wysoki poziom beta - hCG, niski poziom uE3,
- C. wysoki poziom AFP, wysoki poziom beta - hCG, niski poziom uE3,
- D. niski poziom AFP, wysoki poziom beta - hCG, wysoki poziom uE3.

Zadanie 0.

Produkcję interleukiny stymulują:

- A. cytokiny,
- B. nukleotydy,
- C. oligosacharydy,
- D. SIgA.

Zadanie 0.

Prawidłowe ułożenie noworodka poddawanego resuscytacji, polega na zastosowaniu pozycji Trendelenburga pod kątem:

- A. $10^\circ - 15^\circ$ do podłoża, głowa w maksymalnym odgięciu,
- B. $10^\circ - 15^\circ$ do podłoża, głowa nie może być nadmiernie odgięta ani przygięta,
- C. $15^\circ - 20^\circ$ do podłoża, głowa w maksymalnym odgięciu,
- D. 30° do podłoża, głowa nie może być nadmiernie odgięta ani przygięta.

Zadanie 0.

Żywnienie troficzne wstrzymuje się w przypadku wystąpienia:

- A. krwawienia z przewodu pokarmowego,
- B. płaczu dziecka,
- C. hipoksji,
- D. oziębienia.

Zadanie 0.

Na okres adaptacji noworodka NIE ma/mają wpływu:

- A. choroby ojca,
- B. choroby matki,
- C. przebieg porodu,
- D. leki stosowane w czasie ciąży i porodu.

Zadanie 0.

Do oceny dojrzałości nerwowo - mięśniowej noworodka służy skala:

- A. Apgar,
- B. Silvermanna,
- C. Ballard,
- D. żadna z powyższych.

Zadanie 0.

Obrzęk piersi u kobiet karmiących jest wynikiem:

- A. patologicznej budowy piersi,
- B. wzrostu poziomu progesteronu i poziomu prolaktyny,
- C. spadku poziomu progesteronu i wzrostu poziomu prolaktyny,
- D. nieprawidłowej techniki karmienia.

Zadanie 0.

Wskazaniem do żywienia troficznego jest:

- A. zaburzenie funkcji połykania u noworodka,
- B. martwicze zapalenie jelit,
- C. krwawienie z przewodu pokarmowego,
- D. brak prawidłowej odpowiedzi.

Zadanie 0.

U noworodka donoszonego, o hiperglikemii świadczy poziom stężenia glukozy w surowicy krwi wynoszący powyżej:

- A. 110 mg/dl,
- B. 120 mg/dl,
- C. 130 mg/dl,
- D. 150 mg/dl.

Zadanie 0.

W celu oceny zażółcenia powłok skórnych u noworodka (natężenia hiperbilirubinemii) wykorzystywany jest schemat:

- A. Kramarek,
- B. Ballard,
- C. Kramera,
- D. Brazeltona.

Zadanie 0.

Odruch Hering - Brenera, to odruch:

- A. zapobiegający aspiracji płynu do pęcherzyków płucnych,
- B. pozwalający na wytworzenie ujemnego ciśnienia w opłucnej,
- C. pozwalający na bierną fazę oddychania,
- D. pozwalający na aktywną fazę oddychania.

Zadanie 0.

Amniopunkcję wykonuje się zwykle:

- A. do 12 tygodnia ciąży,
- B. między 12-14 tygodniem ciąży,
- C. między 15-20 tygodniem ciąży,
- D. między 18-22 tygodniem ciąży.

Zadanie 0.

Które z poniższych objawów mogą wskazywać na fizjologiczny refluks żołądkowo - jelitowy u noworodka?

- A. noworodek ulewa i sporadycznie wymiotuje, ale zjada chętnie i prawidłowo się rozwija,
- B. objawy wyraźnie zmniejszają się z tygodnia na tydzień, a epizodom ulewania nie towarzyszą żadne inne objawy,
- C. narastanie objawów wiąże się ze zwiększaniem zjadanej wraz z wiekiem objętości pokarmu,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.

W połowie 2 miesiąca życia zanika u dziecka odruch, gdzie noworodek podczas jednoczesnego ucisku na wewnętrzną powierzchnię obu dłoni otwiera usta. Jest to odruch:

- A. szukania,
- B. toniczny szyjny symetryczny,
- C. ssania,
- D. Babkina.

Zadanie 0.

Stolce przejściowe u noworodka, to stolce:

- A. o żółtym zabarwieniu i luźnej konsystencji,
- B. wodniste o zielonym zabarwieniu,
- C. o brązowo - zielonym zabarwieniu i luźnej konsystencji,
- D. wodniste o żółtym zabarwieniu.

Zadanie 0.

Wykonywany u noworodka test Apt jest to badanie, które pozwala na:

- A. ocenę zewnętrznych cech fizycznych,
- B. ocenę neurologiczną,
- C. różnicowanie krwi dziecka z krwią matki,
- D. brak prawidłowej odpowiedzi.

Zadanie 0.

Proszę wskazać zalecaną kolejność nakłuwania żył u noworodka:

- A. żyły grzbietu dłoni, żyły grzbietu stopy, żyły nadgarstka, żyły dołu łokciowego, żyły czaszkowe, żyły okolicy kostki przyśrodkowej,
- B. żyły nadgarstka, żyły dołu łokciowego, żyły grzbietu dłoni, żyły grzbietu stopy, żyły czaszkowe, żyły okolicy kostki przyśrodkowej,
- C. żyły dołu łokciowego, żyły nadgarstka, żyły grzbietu dłoni, żyły grzbietu stopy, żyły czaszkowe, żyły okolicy kostki przyśrodkowej,
- D. żyły czaszkowe, żyły grzbietu dłoni, żyły grzbietu stopy, żyły nadgarstka, żyły dołu łokciowego, żyły okolicy kostki przyśrodkowej.

Zadanie 0.

Zalecaną u noworodków metodą badań przesiewowych słuchu jest ocena fotoemisji akustycznej - OAE. Jest to badanie wykonywane w:

- A. 1 dobie życia,
- B. 2 dobie życia,
- C. 3 dobie życia,
- D. 4 dobie życia.

Zadanie 0.

Które z poniższych stwierdzeń, dotyczących postępowania z odciągniętym wcześniej pokarmem matki, jest FAŁSZYWE?

- A. pokarm raz rozmrożony nie nadaje się do powtórnego zamrożenia,
- B. nie należy mieszać ze sobą mleka świeżo odciągniętego z rozmrożonym,
- C. pokarm przed podaniem dziecku wystarczy podgrzać do temperatury około 36° - 37°C,
- D. po rozmrożeniu pokarm kobiecy można przechowywać w lodówce do 48 godzin.

Zadanie 0.

Wzrost bifidobakterii pobudzają:

- A. cytokiny,
- B. nukleotydy,
- C. oligosacharydy,
- D. SIgA.

Zadanie 0.

Pomiar obwodu głowy dokonywany po porodzie, jest mierzony przy użyciu taśmy centymetrowej w wymiarze:

- A. podpotyliczno - czołowym,
- B. bródowo - ciemieniowym,
- C. podpotyliczno - ciemieniowym,
- D. czołowo - potylicznym.

Zadanie 0.

Występujące w pierwszej dobie życia noworodka objawy: nieregularny oddech połączony z wysiłkiem, błądź powłok skórných, zapadnięty (łódkowaty) brzuch, sugerują:

- A. wrodzoną przepuklinę pępkową,
- B. porażenie nerwu twarzowego,
- C. gastroschizę,
- D. wrodzoną przepuklinę przeponową.

Zadanie 0.

Porażenie splotu barkowego uwidacznia się u noworodka podczas badania odruchu:

- A. Moro,
- B. stąpania,
- C. ssania,
- D. pełzania.

Zadanie 0.

Wykonując czynności pielęgnacyjne u noworodka z martwiczym zapaleniem jelit można zauważyć objaw Culensa podczas obserwowania:

- A. klatki piersiowej i brzuszka noworodka,
- B. główki i oczu noworodka,
- C. kończyn górnych i dłoni noworodka,
- D. kończyn dolnych i stóp noworodka.

Zadanie 0.

W postępowaniu przedoperacyjnym u noworodka z gastroschizą najbardziej istotne znaczenie ma:

- A. zaopatrzenie gastroschizy jałowym, wilgotnym opatrunkiem w sterylnym worku nylonowym, założenie cewnika do żołądka i okresowe odsysanie treści żołądkowej oraz powietrza,
- B. zaopatrzenie gastroschizy jałowym, suchym opatrunkiem i monitorowanie czynności życiowych,
- C. monitorowanie czynności życiowych i założenie zgłębnika do żołądka,
- D. umieszczenie noworodka w inkubatorze i zaopatrzenie gastroschizy jałowym opatrunkiem.

Zadanie 0.

Do wczesnych objawów mózgowego porażenia dziecięcego należy/ą:

- A. zaburzenia wzroku i słuchu,
- B. zaburzenia napięcia mięśni i czynności ruchowych,
- C. padaczka,
- D. upośledzenie umysłowe.

Zadanie 0.

Następstwem mechanicznego urazu okołoporodowego mogą być:

- A. zmiany tkankowe, funkcjonalne i strukturalne w organizmie dziecka,
- B. powikłania doprowadzające często do trwałych uszkodzeń różnych narządów u dziecka,
- C. zmiany wytwórcze i degeneracyjne wpływające na jakość życia dziecka oraz wartość biologiczną populacji,
- D. wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 0.

Objaw "zachodzącego słońca", obserwujemy, gdy dziecko patrzy:

- A. w lewą stronę, źrenica prawego oka ulega powiększeniu,
- B. na wprost, ma źrenice częściowo przesłonięte przez dolną powiekę, a nad źrenicą widoczny jest rąbek białkówki nieprzykryty górną powieką,
- C. na wprost, ma źrenice częściowo przesłonięte przez górną powiekę, a pod źrenicą widoczny jest rąbek białkówki nieprzykryty dolną powieką,
- D. w prawą stronę, powieki oka lewego są zamknięte.

Zadanie 0.

Dokończ zdanie. Mózgowe porażenie dziecięce:

- A. charakteryzuje odwracalność zmian ośrodkowego układu nerwowego,
- B. charakteryzuje zmienność objawów klinicznych powiązanych z różnymi neurologicznymi objawami,
- C. to zespół zaburzeń motorycznych i postawy o charakterze niepostępującym oraz obecność dodatkowych dysfunkcji,
- D. to zespół głównie zaburzeń motorycznych i postawy, o charakterze postępującym oraz obecność dodatkowych dysfunkcji.

Zadanie 0.

W zespole Pierre'a Robina występują jednocześnie:

- A. znaczne cofnięcie żuchwy, zapadanie się języka w kierunku gardła, rozszczep podniebienia,
- B. znaczne cofnięcie żuchwy, rozszczep wargi i wyrostka zębodołowego szczęki,
- C. zapadanie się języka w kierunku gardła, rozszczep podniebienia i wargi,
- D. znaczne cofnięcie żuchwy, rozszczep podniebienia i wargi.

Zadanie 0.

Zasady, które ułatwiają dziecku z mózgowym porażeniem dziecięcym osiągnięcie umiejętności spożywania pokarmów ww wczesnym okresie życia to m.in.:

- A. karmienie noworodka w pozycji półsiedzącej, twarzą do karmiącego, głową w linii środkowej ciała, brodą w linii mostka i symetrycznie ustawionym tułowiem,
- B. likwidacja wzmożonego ślinienia się i nadmiernej wrażliwości okolicy ust,
- C. karmienie dziecka na rękach, w pozycji prawie płaskiej, która likwiduje nadmierne napięcie mięśniowe u dziecka,
- D. wyłączne karmienie piersią.

Zadanie 0.

Podaż pokarmu drogą enteralną musi być wstrzymana do czasu zakończenia diagnostyki w przypadku:

- A. rozszczepu podniebienia,
- B. przetoki przełykowo-tchawiczej,
- C. zespołu Pierre'a Robina,
- D. wrodzonego kręczu mięśniowego szyi.

Zadanie 0.

Nadmierne wydzielanie śliny przez nos i usta u noworodka w krótkim czasie po urodzeniu może być objawem:

- A. porażenia nerwu przeponowego,
- B. niedrożności przełyku,
- C. krwawienia dootrzewnowego,
- D. wzdęcia brzuszka.

Zadanie 0.

W pozycji drenażowej noworodek może pozostać:

- A. 10 - 15 min,
- B. 20 - 30 min,
- C. 30 - 50 min,
- D. 1 - 2 godz.

Zadanie 0.

Metoda rehabilitacyjna wykorzystująca do badań odruchy to:

- A. metoda Wojty,
- B. metoda Glana Domana,
- C. metoda NDT - Bobath,
- D. metoda M. Block.

Zadanie 0.

Stany zachowania noworodka można sprawdzić skalą:

- A. Prechtla,
- B. Ballard,
- C. Brazeltona,
- D. Amiel - Tison.

Zadanie 0.

Odruch ssania u noworodka można sprowokować przez:

- A. przesuwanie kciukiem i palcem wskazującym po policzkach dziecka,
- B. stosowanie na wargi i koniuszek języka delikatne ciepło - zimno,
- C. stosowanie na koniuszek języka bodźce smakowe słone - ostre,
- D. wszystkie powyższe.

Zadanie 0.

U noworodka przedwcześnie urodzonego, niedobór surfaktantu prowadzi do nasilającej się niedodmy, co powoduje:

- A. zmniejszenie wysiłku oddechowego,
- B. zaburzenie stosunku wentylacji do perfuzji,
- C. zmniejszenie napięcia powierzchniowego w pęcherzykach płucnych,
- D. zwiększenie podatności płuc.

Zadanie 0.

Do oceny noworodków z zaburzeniami wzrostu zarówno hipotroficznych jak i hipertroficznych służy:

- A. wskaźnik BMI,
- B. wskaźnik wagowy,
- C. wskaźnik rozwojowy,
- D. wskaźnik proporcjonalności.

Zadanie 0.

Do wystąpienia RDS (respiratory distress syndrome) u noworodka predysponuje:

- A. płeć żeńska,
- B. cukrzyca u matki,
- C. poród przedwczesny,
- D. prawidłowe odpowiedzi B i C.

Zadanie 0.

Noworodek z hipotrofią:

- A. posiada masę ciała poniżej 10 centyla,
- B. posiada masę ciała poniżej 2500g,
- C. wykazuje cechy zahamowania wzrostu,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.

W przypadku noworodka, bezdech to przerwa w oddychaniu powyżej:

- A. 30 sekund oraz bradykardia poniżej 60/min.,
- B. 20 sekund oraz bradykardia poniżej 80/min.,
- C. 15 sekund oraz tachykardia powyżej 100/min.,
- D. 10 sekund oraz tachykardia powyżej 110/min.

Zadanie 0.

W nieproporcjonalnym IUGR obserwujemy:

- A. nieproporcjonalnie większy obwód brzucha od obwodu głowy,
- B. nieproporcjonalnie mniejszy obwód brzucha od obwodu głowy,
- C. obwód brzucha równy obwodowi głowy,
- D. brak prawidłowej odpowiedzi.

Zadanie 0.

W opiece nad noworodkiem przedwcześnie urodzonym istotne znaczenie ma zapobieganie bezdechom. Do działań wdrażanych samodzielnie przez pielęgniarkę neonatologiczną należą:

- A. utrzymywanie prawidłowej temperatury ciała noworodka,
- B. stosowanie stymulacji dotykowej,
- C. wprowadzenie do farmakoterapii metyloksantyn,
- D. prawidłowe są odpowiedzi A i B.

Zadanie 0.

Do grupy wyłącznie matczynej przyczyn wcześniactwa należą:

- A. krwawienia w ciąży, łożysko przodujące, nadciśnienie u matki,
- B. cukrzyca u matki, ciąża wielopłodowa, krwawienia w ciąży,
- C. stres, papierosy, choroba hemolityczna noworodka,
- D. łożysko przedwcześnie oddzielone, patologia rodziny, niewydolność cieśniowo - szyjkowa.

Zadanie 0.

Zakażenia TORCH należą do czynników IUGR:

- A. matczynej,
- B. środowiskowych,
- C. płodowych,
- D. łożyskowych.

Zadanie 0.

Łagodna postać choroby hemolitycznej charakteryzuje się: 1. poziomem hemoglobiny poniżej 14 g/dl, 2. wysoka retikulocytoza, 3. poziomem hemoglobiny powyżej 14 g/dl, 4. poziomem bilirubiny < 4 mg%, 5. licznymi erytroblastami we krwi obwodowej.

- A. 1, 2,
- B. 4, 5,
- C. 1, 4,
- D. 3, 4.

Zadanie 0.

Specyficznymi objawami klinicznymi niedokrwistości u wcześniaków NIE jest/są:

- A. słaby przyrost masy ciała,
- B. bladość powłok,
- C. trudności w karmieniu,
- D. drgawki.

Zadanie 0.

Do oceny ciężkości zaburzeń oddychania u noworodków służy skala:

- A. V. Apgar,
- B. Ballard,
- C. Silvermanna,
- D. prawidłowe odpowiedzi B i C.

Zadanie 0.

Przejęciowe zaburzenia oddychania predysponują do żywienia pozajelitowego. Karmienie doustne wprowadza się:

- A. po zmniejszeniu liczby oddechów poniżej 100/min,
- B. po zmniejszeniu liczby oddechów poniżej 80/min,
- C. po zmniejszeniu liczby oddechów poniżej 60/min,
- D. po zmniejszeniu liczby oddechów poniżej 40/min.

Zadanie 0.

U wcześniaków, niedokrwistość pochodzenia jatrogennego jest wynikiem:

- A. niedoboru witaminy E,
- B. częstego pobierania krwi do badań,
- C. krwawień,
- D. wzmożonej hemolizy.

Zadanie 0.

Do czynników ryzyka występowania noworodkowej hipokalcemii NIE należy:

- A. płeć męska,
- B. poród wczesną wiosną,
- C. niedoczynność przytarczyc u matki,
- D. niedotlenienie okołoporodowe.

Zadanie 0.

Celem leczniczym w tlenoterapii jest utrzymanie we krwi tętnicznej prężności tlenu w granicach:

- A. 80 - 100 mmHg,
- B. 60 - 80 mmHg,
- C. 50 - 70 mmHg,
- D. 20 - 40 mmHg.

Zadanie 0.

Objawy ostrej niewydolności oddechowej u noworodka to:

- A. tachypnoe powyżej 60 min,
- B. tachykardia powyżej 160/min,
- C. napady bezdechu,
- D. wszystkie powyższe.

Zadanie 0.

Najczęstszą przyczyną żółtaczki patologicznej u noworodka donoszonego lub wcześniaka po pierwszym tygodniu życia jest:

- A. farmakoterapia,
- B. uogólnione zakażenie,
- C. wchłanianie wynaczynionej krwi,
- D. polycytomia.

Zadanie 0.

W zapobieganiu krwawień śródczaszkowych:

- A. unika się bodźców bólowych i unika się zbyt szybkiego wstrzykiwania leków,
- B. podaje się leki o zwiększonej osmolarności,
- C. podwyższa się ciśnienie tętnicze krwi,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.

Główne objawy policytemii to:

- A. oliguria, zaburzenia oddechowe, martwicze zapalenie jelit,
- B. wielomocz, zaburzenia oddechowe, martwicze zapalenie jelit,
- C. hiperglikemia, hiperkalcemia, oliguria,
- D. hipoglikemia, hiperkalcemia, wielomocz.

Zadanie 0.

Zaburzenia oddychania są najczęściej spotykanym zespołem objawów w okresie noworodkowym i charakteryzują się następującymi objawami klinicznymi:

- A. tachypnoe powyżej 40 min, napady bezdechu, ostre niedotlenienie, poruszanie skrzydełkami nosa, sinica pochodzenia obwodowego,
- B. zaburzenia rytmu i typu oddechów, stękanie wydechowe, hipoksja, wciąganie mięśni oddechowych, bladość,
- C. tachypnoe powyżej 60 min, stękanie wydechowe, wciąganie klatki piersiowej, poruszanie skrzydełkami nosa, sinica przy oddychaniu powietrzem,
- D. zaburzenia rytmu i typu oddechów, hipoksja, sinica pochodzenia obwodowego, stękanie wydechowe, ostre niedotlenienie.

Zadanie 0.

Wskaż odpowiedź prawdziwą dotyczącą tlenoterapii noworodków:

- A. tlen jest lekiem potencjalnie niebezpiecznym i może doprowadzić do uszkodzenia narządu wzroku oraz płuc,
- B. tlen należy przed podaniem ogrzać (temperatura 34°-37°C) i nawilżyć (wilgotność względna 90 -100%),
- C. w czasie leczenia tlenem konieczna jest kontrola gazometryczna prężności tlenu we krwi,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawdziwe.

Zadanie 0.

Proszę wskazać prawidłową odpowiedź dla FiO₂:

- A. oznacza prężność tlenu,
- B. pozwala precyzyjnie kontrolować tlenoterapię,
- C. to stężenie procentowe tlenu w mieszaninie oddechowej,
- D. odpowiedzi B i C są prawidłowe.

Zadanie 0.

Najlepszy czas podawania atropiny przed intubacją noworodka to:

- A. 5 min,
- B. 10 min,
- C. 15 min,
- D. 20 min.

Zadanie 0.

Asfiksja to:

- A. zamartwica,
- B. niedotlenienie okołoporodowe,
- C. wcześniactwo,
- D. prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 0.

Do cech tetralogii Fallota NIE należy:

- A. ubytek przegrody międzykomorowej,
- B. przerost prawej komory,
- C. zwężenie drogi odpływu z prawej komory,
- D. połączenie prawej i lewej tętnicy płucnej.

Zadanie 0.

Wykładnikiem niedotlenienia okołoporodowego jest:

- A. pH spadek 5,0, wzrost mocznika, wzrost AlAT, wzrost leukocytów, spadek płytek krwi,
- B. pH wzrost 5,0, spadek mocznika, spadek AlAT, spadek leukocytów, wzrost płytek krwi,
- C. pH spadek 7,0, wzrost kreatyniny, wzrost AspAT, wzrost erytroblastów, spadek płytek krwi,
- D. pH wzrost 7,0, spadek kreatyniny, spadek AspAT, spadek erytroblastów, wzrost płytek krwi.

Zadanie 0.

O niedotlenieniu okołoporodowym u noworodka świadczy/ą:

- A. obniżone napięcie mięśniowe,
- B. drgawki,
- C. obniżenie poziomu płytek krwi,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.

Podaż leków w trakcie resuscytacji noworodka może odbywać się:

- A. dotchawiczo,
- B. drogą żył obwodowych,
- C. przez żyłę pępkową,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.

Minimalne żywienie troficzne wprowadzane u wcześniaków to żywienie:

- A. enteralne (do 15 ml/kg mc./dobę),
- B. parenteralne,
- C. pozajelitowe,
- D. enteralne lub parenteralne w zależności od stanu dziecka.

Zadanie 0.

Lekiem podstawowym stosowanym podczas resuscytacji noworodka jest:

- A. adrenalina,
- B. epinefryna,
- C. wodorowęglan sodu,
- D. prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 0.

"Krwawienie dokomorowe z krwawieniem do miąższu mózgu", to w klasyfikacji krwawień dokomorowych wg Papile'a:

- A. I stopień krwawienia,
- B. II stopień krwawienia,
- C. III stopień krwawienia,
- D. IV stopień krwawienia.

Zadanie 0.

Powikłaniem fototerapii jest/są:

- A. przegrzanie dziecka,
- B. pęknięcie nitek DNA,
- C. spadek rzutu serca,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.

Drenaż ułożeniowy stosowany u noworodków w ramach zabiegów fizykoterapeutycznych polega na:

- A. układaniu noworodka w takiej pozycji, aby segment płuca płucnego z zalegającą wydzieliną znajdował się jak najwyżej,
- B. układaniu noworodka w takiej pozycji, aby segment płuca płucnego z zalegającą wydzieliną znajdował się jak najniżej,
- C. wykorzystaniu siły grawitacji,
- D. prawidłowa odpowiedź A i C.

Zadanie 0.

Do działań niepożądanych opioidów stosowanych u noworodka należy/ą:

- A. bradykardia,
- B. depresja układu oddechowego,
- C. tachykardia,
- D. prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 0.

Wodorowęglan sodu podawany dożylnie noworodkowi, należy do iniekcji rozcieńczyć z wodą:

- A. w stosunku 1:1,
- B. w stosunku 1:2,
- C. w stosunku 2:1,
- D. wodorowęglan sodu nigdy nie powinien być rozcieńczany przy podaży dożylniej.

Zadanie 0.

Nieobecny odruch ssania i Moro w encefalopatii niedotleniowo - niedokrwiennej świadczy o:

- A. postaci łagodnej,
- B. postaci umiarkowanej,
- C. postaci średnio - ciężkiej,
- D. postaci ciężkiej.

Zadanie 0.

Wcześnie urodzonego przed ukończeniem 28 tygodnia ciąży:

- A. osusza się bezpośrednio po porodzie,
- B. okrywa ciepłą pieluchą,
- C. umieszcza się bezpośrednio po porodzie w folii plastikowej bez uprzedniego osuszenia skóry,
- D. umieszcza się bezpośrednio po porodzie w folii plastikowej po osuszeniu skóry.

Zadanie 0.

Do powikłań związanych z założeniem cewnika do żyły pępowinowej należą:

- A. zator powietrzny,
- B. zakażenie,
- C. krwawienie związane z przypadkowym usunięciem cewnika,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.

Niefarmakologicznym sposobem zmniejszania bólu u noworodka jest:

- A. podanie smoczka do ssania,
- B. używanie tzw. "gniazdek" noworodkowych,
- C. zmniejszenie natężenia światła i hałasu,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.

Zespołem genetycznym spowodowanym trisomią chromosomów autosomalnych NIE jest zespół:

- A. Downa,
- B. Patau,
- C. Edwardsa,
- D. Turnera.

Zadanie 0.

Do objawów klinicznych zespołu zaburzeń oddychania u noworodka urodzonego przedwcześnie NIE należy:

- A. stękanie wydechowe,
- B. zaciąganie przestrzeni międzyżebrowych,
- C. anuria,
- D. bezdech.

Zadanie 0.

Pomiar ciśnienia tętniczego krwi u noworodka metodą inwazyjną polega na założeniu kaniuli do:

- A. obwodowego naczynia żylnego,
- B. prawego przedsionka serca,
- C. naczynia tętniczego (np. tętnicy pępowinowej, promieniowej),
- D. pnia płucnego.

Zadanie 0.

U noworodka, intubacji NIE wykonuje się przy występowaniu:

- A. przepukliny pępkowej,
- B. smółki w płynie owodniowym,
- C. wytrzewienia,
- D. brak prawidłowej odpowiedzi.

Zadanie 0.

W celu drenażu segmentów górnych płatów dolnych płuc, noworodka należy ułożyć w pozycji:

- A. na plecach,
- B. na brzuchu,
- C. Trendelenburga,
- D. Fowlera.

Zadanie 0.

Do objawów klinicznych niedrożności smólkowej jelit należy/należą:

- A. wzdęcie brzuszka,
- B. brak stolca,
- C. wymioty,
- D. wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 0.

Jedną z reakcji noworodka na ból jest płacz. Jest to reakcja:

- A. behawioralna,
- B. fizjologiczna,
- C. hormonalna,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.

Krwawienie stanowi najczęstszą przyczynę wstrząsu:

- A. kardiogenne,
- B. obstruktywnego,
- C. hipowolemicznego,
- D. krwawienie nie powoduje wstrząsu.

Zadanie 0.

Standardowe nastawianie alarmów dla SaO₂ to:

- A. 80 - 90%,
- B. 80 - 88%,
- C. 88 - 95%,
- D. 90 - 98%.

Zadanie 0.

Głębokość założenia zgłębnika żołądkowego u noworodka określamy odmierzając odległość:

- A. od dolnego końca mostka, poprzez nasadę nosa do płatka usznego,
- B. od górnego końca mostka, poprzez nasadę nosa do płatka usznego,
- C. od dolnego końca mostka, poprzez zewnętrzny kącik oka do nasady nosa,
- D. od górnego końca mostka, poprzez zewnętrzny kącik oka do płatka usznego.

Zadanie 0.

Suplementację witaminy K w profilaktyce choroby krwotocznej stosuje się:

- A. tylko u noworodków urodzonych przedwcześnie,
- B. u noworodków i niemowląt karmionych sztucznie,
- C. u noworodków i niemowląt karmionych wyłącznie piersią od 2 tygodnia do końca 3 miesiąca życia,
- D. u noworodków i niemowląt karmionych wyłącznie piersią od 6 tygodnia do końca 3 miesiąca życia.

Zadanie 0.

Niedorozwój zuchwy, zapadanie się języka ku tyłowi, wole powodujące ucisk tchawicy, skośne ustawienie gałek ocznych, niskie osadzenie małżowin usznych to objawy charakteryzujące zespół:

- A. Downa,
- B. Pierre'a Robina,
- C. Patau,
- D. Marfana.

Zadanie 0.

U chorych noworodków i wcześniaków rutynowym badaniem na oddziale w celu potwierdzenia martwiczego zapalenia jelit jest:

- A. USG jamy brzusznej,
- B. badanie stolca na krew utajoną,
- C. RTG przeglądowe jamy brzusznej,
- D. biopsja jelita.

Zadanie 0.

Powikłaniem po cewnikowaniu żyły pępkowej jest:

- A. krwotok,
- B. zaburzenia rytmu serca,
- C. odruchowe obkurczenie naczyń kończyn dolnych,
- D. prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 0.

W zespole Pierre'a Robina noworodka układa się w pozycji:

- A. na wznak,
- B. na boku,
- C. na brzuchu,
- D. wysokiej lub półwysokiej.

Zadanie 0.

U noworodka, utrata ciepła następuje poprzez:

- A. konwekcję,
- B. przewodzenie,
- C. parowanie,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.

Wskazania do pomiaru średniego ciśnienia tętniczego krwi metodą napływową (pośrednią), to:

- A. obniżona ocena wg skali Apgar,
- B. wcześniactwo,
- C. objawy wstrząsu,
- D. wszystkie powyższe.

Zadanie 0.

Depersonalizacja jest jedną z faz:

- A. asertywności,
- B. stresu,
- C. syndromu wypalenia zawodowego,
- D. prewencji wypalenia zawodowego.

Zadanie 0.

Stosując styl rzeczowy (zasadniczy) w negocjacjach, uczestnicy:

- A. traktują problem i ludzi delikatnie,
- B. traktują ludzi delikatnie i są twardzi wobec problemu,
- C. są twardzi wobec ludzi i problemu,
- D. nie ufają innym.

Zadanie 0.

Kształcenie ustawiczne, to kształcenie:

- A. prowadzone przez instytucje państwowe realizujące programy rekompensujące braki w wykształceniu ogólnym,
- B. obejmujące różne poziomy kształcenia ogólnego i specjalistycznego realizowane w ciągu życia przez kształcenie i samokształcenie,
- C. inicjowane, planowane, realizowane i oceniane samodzielnie przez osobę uczącą się w okresie trwania pracy zawodowej,
- D. nakazane ustawą o zawodzie pielęgniarki i położnej, które ma być zrealizowane w ośrodkach akademickich.

Zadanie 0.

Motywacja w życiu człowieka spełnia następujące funkcje:

- A. kształcącą, ewaluacyjną, emocjonalną,
- B. aktywizującą, kierującą, selekcyjną,
- C. kierującą, konstruktywną, szczególności,
- D. ewaluacyjną, poznawczą, emocjonalną.

Zadanie 0.

Wskaźnik socjomedyczny "Profil wpływu choroby" określa:

- A. ocenę funkcjonalną jednostki,
- B. ocenę zdrowia somatycznego,
- C. ocenę złego samopoczucia,
- D. samoocenę zdrowia psychicznego i somatycznego.

Zadanie 0.

Rola chorego według T. Parsonsa dotyczyła:

- A. procesu stygmatyzacji,
- B. kontroli społecznej,
- C. negacji roli chorego,
- D. identyfikacji z rolą chorego

Zadanie 0.

Podstawową cnotą moralną jest roztropność. Która z poniżej podanych cech NIE jest cechą roztropności?

- A. domyślność,
- B. otwartość,
- C. sprawiedliwość,
- D. zapobiegliwość.

Zadanie 0.

Za szkodę wyrządzoną pacjentowi przez pielęgniarkę wykonującą obowiązki pracownicze, odpowiedzialność odszkodowawczą ponosi:

- A. towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym pielęgniarka posiada polisę OC,
- B. zakład pracy pielęgniarki,
- C. pielęgniarka,
- D. przełożony pielęgniarki.

Zadanie 0.

Analizę kosztów i efektów przeprowadza się w dwóch przypadkach:

- A. kiedy nowa metoda postępowania jest skuteczniejsza, ale zarazem mniej skuteczna od innej metody, kiedy nowa metoda postępowania jest w niewielkim stopniu mniej skuteczna, ale tańsza (efektywna zdrowotnie),
- B. kiedy stara metoda postępowania jest droższa, ale skuteczniejsza od innej metody, kiedy jednocześnie stara metoda postępowania jest mniej skuteczna, ale tańsza (efektywna kosztowo),
- C. kiedy nowa metoda postępowania jest droższa, ale skuteczniejsza od innej metody, kiedy nowa metoda postępowania jest mniej skuteczna, ale tańsza (efektywna kosztowo). Koszty wyrażone są w nakładach pieniężnych,
- D. kiedy nowa metoda postępowania jest tańsza, ale skuteczniejsza od innej metody, kiedy nowa metoda postępowania jest więcej skuteczna, ale tańsza (efektywna kosztowo).

Zadanie 0.

Zasada ubezpieczenia zdrowotnego polegająca na tym, że fundusz powstały ze składek sprawuje opiekę zgodnie, z którą publiczny system opieki zdrowotnej umożliwia finansowanie opieki nad ludźmi chorymi i/lub uboższymi przez ludzi zdrowych i/lub bogatszych, nosi nazwę:

- A. utylitaryzmu społecznego,
- B. solidaryzmu społecznego,
- C. indywidualizmu społecznego,
- D. egalitaryzmu społecznego.

Zadanie 0.

Marketing w ochronie zdrowia można postrzegać jako:

- A. funkcję wspomagającą zarządzanie,
- B. jedną ze sfer wpływających na jakość usług medycznych,
- C. marketingowe zarządzanie całą placówką,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.

Które z następujących stwierdzeń jest prawdziwe?

- A. większość metod zarządzania będzie skuteczna w każdym warunkach,
- B. nie istnieje jedyna technika, która działałaby skutecznie w każdej sytuacji,
- C. sytuacje mogą różnie wyglądać, lecz ich istota jest zawsze taka sama,
- D. sytuacje różnią się do tego stopnia, do jakiego dany menedżer myśli, że się różnią.

Zadanie 0.

Rozporządzenie Rady 1408/71 EWG dotyczące stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób pracujących na własny rachunek i członków ich rodzin przemieszczających się w obrębie Wspólnoty, wprowadziło system opierający się na:

- A. trzech podstawowych zasadach - równości traktowania obywateli Wspólnoty, stosowanie ustawodawstwa, jednego państwa członkowskiego,
- B. czterech podstawowych zasadach - równości traktowania obywateli Wspólnoty, stosowanie ustawodawstwa jednego państwa członkowskiego, stosowanie praw nabytych i będących w trakcie ich nabywania oraz eksportu świadczeń,
- C. pięciu podstawowych zasadach - równości traktowania obywateli Wspólnoty, stosowanie ustawodawstwa jednego państwa członkowskiego, stosowanie praw nabytych i będących w trakcie ich nabywania oraz eksportu świadczeń a także swobody świadczenia usług,
- D. dwóch podstawowych zasadach - równości traktowania obywateli Wspólnoty, stosowanie praw nabytych i będących w trakcie ich nabywania.

Zadanie 0.

Pomoc społeczną na zasadach określonych w ustawie, udziela się osobom i rodzinom, m.in. z powodu:

- A. ubóstwa, wykluczenia społecznego, niepełnosprawności, choroby trwającej powyżej 6 miesięcy lub bezradności,
- B. ubóstwa, bezdomności, długotrwałej choroby, klęski żywiołowej lub ekologicznej bez względu na stan zdrowia lub niepełnosprawności,
- C. ubóstwa, bezdomności, długotrwałej choroby, klęski żywiołowej lub ekologicznej,
- D. ubóstwa, bezradności, zgłoszenia biedy przez sąsiadów, długotrwałej choroby trwającej maksymalnie do 6 miesięcy, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Zadanie 0.

Zdrowie jako dobro publiczne wynika z:

- A. konstytucyjnych uprawnień obywateli do bezpieczeństwa zdrowotnego dzięki zapewnieniu powszechnej dostępności do świadczeń zdrowotnych,
- B. budżetowych uprawnień obywateli do bezpieczeństwa zdrowotnego dzięki zapewnieniu powszechnej dostępności do świadczeń zdrowotnych,
- C. ubezpieczeniowych uprawnień obywateli do bezpieczeństwa zdrowotnego dzięki zapewnieniu powszechnej dostępności do świadczeń zdrowotnych,
- D. budżetowych i ubezpieczeniowych uprawnień obywateli do bezpieczeństwa zdrowotnego dzięki zapewnieniu powszechnej dostępności do świadczeń zdrowotnych.

Zadanie 0.

Prawidłowa czynność serca noworodka donoszonego wynosi:

- A. 100-140 uderzeń/minutę,
- B. 110-160 uderzeń/minutę,
- C. 120-160 uderzeń/minutę,
- D. 140-180 uderzeń/minutę.

Zadanie 0.

Do czynników ryzyka rozwojowej dysplazji stawów biodrowych NIE należy:

- A. wcześniactwo,
- B. ciąża u pierwiastki,
- C. małowodzie,
- D. poród poślądkowy.

Zadanie 0.

Noworodek jest bardzo wrażliwy na obniżenie temperatury ciała, ponieważ:

- A. posiada nadmiar brązowej tkanki tłuszczowej i glikogenu,
- B. posiada zdolność do uzyskania ciepła na drodze drżeniowej,
- C. istnieje u niego dysproporcja pomiędzy powierzchnią a masą ciała,
- D. wykazuje małą aktywność fizyczną.

Zadanie 0.

Jaka jest średnia wielkość ciemienia przedniego u noworodka?

- A. 1-2 cm,
- B. 1-3 cm,
- C. 2-3 cm,
- D. 2-4 cm.

Zadanie 0.

Płacz małego dziecka nie zawsze jest stanem negatywnym. W badaniu fizykalnym jest to dobry moment do zbadania u dziecka:

- A. głosu (mowy),
- B. szmerów oddechowych,
- C. gardła i migdałków,
- D. sinicy.

Zadanie 0.

Świsty, to:

- A. przerywane, krótkie dźwięki o wysokim lub niskim tonie,
- B. skrzypiące, skrobiące odgłosy, występujące przy wykonywaniu ruchów oddechowych,
- C. ciągłe odgłosy o wysokim tonie z elementami syczenia,
- D. odgłosy o względnie niskim tonie z elementami chrapliwości.

Zadanie 0.

Stwierdzając w badaniu fizykalnym różnicę w tętnie na kończynach górnych, przy towarzyszącym silnym, rozdzierającym bólu w klatce piersiowej, najbardziej prawdopodobnym rozpoznaniem, jest:

- A. zawał mięśnia sercowego,
- B. ostre zapalenie osierdzia,
- C. tętniak rozwarstwiający aorty,
- D. zator tętnicy płucnej.

Zadanie 0.

Odruch szukania u niemowlęcia zanika w 3-4 miesiącu życia. Może być obecny dłużej w czasie:

- A. płaczu,
- B. snu,
- C. karmienia,
- D. ułożenia na brzuchu.

Zadanie 0.

Podczas karmienia piersią u noworodka mogą wystąpić problemy oddechowe, najczęściej spowodowane:

- A. nieprawidłowym ułożeniem noworodka do karmienia,
- B. niedrożnością nosa,
- C. niedojrzałością tkanki płucnej,
- D. nie wykształceniem się surfaktantu.

Zadanie 0.

Znajdź twierdzenie FAŁSZYWE. Prowadząc wywiad dotyczący chorób przebytych należy uwzględnić pytania, które pozwolą pozyskać informacje dotyczące:

- A. chorób wieku dziecięcego, szczepień,
- B. hospitalizacji i zabiegów operacyjnych,
- C. chorób psychicznych, przyjmowanych leków,
- D. przyczyn hospitalizacji rodzeństwa i rodziców.

Zadanie 0.

Podstawowymi objawami duszności u niemowlęcia są:

- A. zwolniony oddech, brak apetytu, gorączka,
- B. przyspieszony oddech, szary cień wokół ust, ruch skrzydełkowy nosa,
- C. przyspieszony oddech, zaczerwienienie twarzy, niepokój,
- D. zwolniony oddech, nadmierna potliwość, brak łaknienia.

Zadanie 0.

Brzeg wątroby u noworodków i małych dzieci jest:

- A. niewyczuwalny,
- B. wyczuwalny około 1-2 cm w linii środkowoobojczykowej prawej,
- C. wyczuwalny około 2-3 cm w linii środkowoobojczykowej prawej,
- D. wyczuwalny około 3-4 cm w linii środkowoobojczykowej prawej.

Zadanie 0.

Ból osierdziowy:

- A. charakteryzuje ostry początek,
- B. jest odczuwalny za mostkiem lub wzdłuż mostka,
- C. łagodnieje w pozycji siedzącej, z pochyleniem do przodu,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.

Stłumiony, krótki odgłos opukowy klatki piersiowej jest charakterystyczny dla:

- A. rozedmy,
- B. znacznego wysięku w opłucnej,
- C. odmy opłucnowej,
- D. zdrowego płuca.

Zadanie 0.

W skali GCS - wyprostna odpowiedź ruchowa oceniana jest na:

- A. 4 punkty,
- B. 3 punkty,
- C. 2 punkty,
- D. 1 punkt.

Zadanie 0.

W jakim czasie po porodzie patologicznym i gdzie powinno odbyć się pierwsze badanie fizykalne noworodka?

- A. możliwie najszybciej po urodzeniu, na sali porodowej,
- B. do 2 godzin po porodzie, w pokoju badań,
- C. do 6 godzin po porodzie, w pokoju badań,
- D. do 12 godzin po porodzie, na oddziale neonatologicznym.

Zadanie 0.

O dodatnim wyniku testu Tinela świadczy uczucie mrowienia, ból lub uczucie przechodzenia prądu:

- A. podczas uciskania na tętnicę promieniową,
- B. podczas przyciskania powierzchni grzbietowych obu wyprostowanych dłoni,
- C. podczas unoszenia wyprostowanej kończyny dolnej,
- D. w okolicy nadgarstka.

Zadanie 0.

W prawidłowym zapisie EKG w odprowadzeniu aVR, załamek P jest:

- A. zawsze ujemny,
- B. zawsze dodatni,
- C. dwufazowy,
- D. "ukryty" w odcinku ST.

Zadanie 0.

W badaniu fizykalnym dziecka płci męskiej stwierdzasz brak jąder w mosznie. Badanie pogłębione wykonujesz przy ułożeniu dziecka w pozycji:

- A. stojącej,
- B. leżącej z przygięciem głowy do klatki piersiowej,
- C. leżącej z rozchylonymi na boki kończynami dolnymi,
- D. siedzącej ze skrzyżowanymi nogami.

Zadanie 0.

Typowymi objawami w przewlekłej niewydolności żylnej są znaczne obrzęki oraz:

- A. brunatne przebarwienia w okolicy kostek,
- B. owrzodzenie palców,
- C. pogrubienie i pękanie paznokci,
- D. zmniejszone ucieplenie kończyn.

Zadanie 0.

Gruzoł tarczowy, powinno badać się:

- A. oburącz, stojąc przed pacjentem,
- B. palcem wskazującym i kciukiem, stojąc przed pacjentem,
- C. oburącz, stojąc za pacjentem,
- D. prawą ręką, stojąc za pacjentem.

Zadanie 0.

Pacjocentryczny model pielęgnowania w Polsce wprowadziła:

- A. Teresa Kulczyńska,
- B. Hanna Chrzanowska,
- C. Rachela Hutner,
- D. Wiesława Ciechaniewicz.

Zadanie 0.

"Stan człowieka poznany na podstawie zgromadzonych danych, którymi pielęgniarca dysponuje, który to stan wyznacza pielęgniarce zadania" definiuje:

- A. pielęgnowanie,
- B. diagnozę pielęgniarczą,
- C. wywiad środowiskowy,
- D. rozpoznanie lekarskie.

Zadanie 0.

W czasie prezentacji ustnej wyników badań pilotażowych NIE należy koncentrować się na:

- A. własnej osobie,
- B. czasie prezentacji,
- C. sile wypowiedzi,
- D. modulacji głosu.

Zadanie 0.

W teście sprawdzającym wiedzę z dziedziny pielęgniarstwa zadanie alternatywne polega na:

- A. wielokrotnej możliwości odpowiedzi z wielu przedstawionych,
- B. jednoznacznym określeniu odpowiedzi prawdziwej lub fałszywej,
- C. przyporządkowaniu tylko odpowiedzi słownej do numerycznej,
- D. podkreśleniu odpowiedzi z godnie z kombinacją zaszeregowania.

Zadanie 0.

W powojennej Polsce, autorką koncepcji podyplomowego kształcenia dla pielęgniarek, była:

- A. Maria Staromiejska,
- B. Hanna Chrzanowska,
- C. Rachela Hutner,
- D. Teresa Kulczyńska.

Zadanie 0.

Kodeks Etyki dla Pielęgniarek Międzynarodowej Rady Pielęgniarek (ICN), został przyjęty w roku:

- A. 1943,
- B. 1953,
- C. 1963,
- D. 1973.

Zadanie 0.

Arkusze kalkulacyjny jest to:

- A. program, wykonujący obliczenia podobne do tych, które wykonuje kalkulator,
- B. program, umożliwiający wykonanie obliczeń na danych w postaci tekstu, liczb,
- C. program do kalkulowania kosztów budowy budynków mieszkalnych, zużycia materiałów, np. ilość potrzebnych pustaków, arkusze blachy itp.,
- D. arkusz papieru, zawierający tabelę z różnorodnymi danymi liczbowymi.

Zadanie 0.

Dane badanych 2500 pacjentów zapisano w komputerowej bazie danych. Zestaw danych zapisanych w takiej bazie dotyczących jednego pacjenta nazywany jest:

- A. polem,
- B. rekordem,
- C. plikiem,
- D. dokumentem.

Zadanie 0.

Które z poniższych określeń opisuje metodę ankietową, jako metodę badawczą stosowaną w statystyce?

- A. uogólnianie wyników szczegółowego badania pojedynczej jednostki na całą zbiorowość,
- B. wnioskowanie na podstawie dobrowolnie udzielonych wypowiedzi na badany temat,
- C. losowe wybieranie ze zbiorowości jednostek reprezentujących tę zbiorowość,
- D. ustalanie nieznanymi cech zbiorowości na podstawie cech znanych tej zbiorowości.