

61	Operacja stożka rogówki metodą cross-linking	Wymagania formalne	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) w lokalizacji: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) oddział szpitalny o profilu: <ul style="list-style-type: none"> <li>– okulistyka lub</li> <li>– okulistyka dla dzieci;</li> </ul> </li> </ol> </li> <li>2) w lokalizacji lub w dostępie: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) poradnia okulistyczna lub</li> <li>b) poradnia okulistyczna dla dzieci.</li> </ol> </li> </ol>
		Personel	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) lekarze: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) specjalista w dziedzinie okulistyki,</li> <li>b) specjalista w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i intensywnej terapii – w przypadku dzieci niewspółpracujących oraz osób dorosłych niewspółpracujących;</li> </ol> </li> <li>2) pielęgniarki: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego, lub po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego, lub w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego,</li> <li>b) specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki – w przypadku dzieci niewspółpracujących oraz osób dorosłych niewspółpracujących.</li> </ol> </li> </ol>
		Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną	<p>W miejscu udzielania świadczeń:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) aparat do CXL;</li> <li>2) tomograf okulistyczny (OCT);</li> <li>3) pachymetr;</li> <li>4) topograf rogówkowy.</li> </ol>
		Warunki kwalifikacji do świadczenia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Do leczenia kwalifikuje się świadczeniobiorcę, spełniającego łącznie następujące warunki: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) rozpoznanie chorobowe ICD–10 H18.6 Stożek rogówki;</li> <li>2) wiek <math>\leq 40</math> lat;</li> <li>3) w przypadku świadczeniobiorców <math>\geq 18</math> roku życia – wymagane wykazanie progresji choroby;</li> </ol> </li> </ol>

			<p>a) oceniana na podstawie 2 badań wykonywanych co 6 miesięcy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– zmianą krzywizny rogówki (Kmax) o <math>\geq 1</math> D, oraz</li> <li>– keratometrią wyjściową <math>\geq 47</math> D,</li> </ul> <p>b) utrzymanie lub pogorszenie ostrość wzroku towarzyszące zmianie krzywizny rogówki, lub</p> <p>c) konieczność wymiany soczewki twardej.</p> <p>2. Przeciwwskazaniami do przeprowadzenia zabiegu są:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) blizna w centralnej części rogówki;</li> <li>2) grubość rogówki <math>&lt; 380\text{--}400</math> <math>\mu\text{m}</math>.</li> </ol>
	Zakres świadczenia	Świadczenie obejmuje:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) znieczulenie miejscowe do zabiegu lub znieczulenie ogólne (w przypadku dzieci niewspółpracujących oraz osób dorosłych niewspółpracujących);</li> <li>2) podanie ryboflawiny (witaminy B2);</li> <li>3) naświetlanie lampą do cross-linking.</li> </ol>
	Warunki organizacji świadczeń	Wizyty kontrolne po operacji stożka rogówki metodą cross-linking:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) wizyta kontrolna w okresie do 1 miesiąca po operacji;</li> <li>2) 2 wizyty kontrolne co 6 miesięcy.</li> </ol>