

Zadanie 0.

Głównym celem Polskiego Towarzystwa Położnych jest:

- A. podnoszenie profesjonalnego poziomu jakości opieki położniczej i w chorobach kobiecych,
- B. doskonalenie zawodowe pielęgniarek i położnych,
- C. reprezentowanie interesów ogółu polskiej ginekologii,
- D. wszystkie wymienione.

Zadanie 0.

Do zadań III poziomu opieki perinatalnej należy:

- A. prowadzenie ciąż i porodów wysokiego ryzyka,
- B. leczenie najcięższych chorych noworodków oraz nadzór nad ich rozwojem psychoruchowym,
- C. odpowiedzi A i B są prawidłowe,
- D. wszystkie odpowiedzi są błędne.

Zadanie 0.

Ile urlopu macierzyńskiego może wykorzystać pracownica w ciąży przed przewidywaną datą porodu?

- A. 1 tydzień,
- B. co najmniej 3 tygodnie,
- C. nie więcej niż 6 tygodni,
- D. cały przysługujący urlop.

Zadanie 0.

Technika rozrodu wspomaganego IVF, to:

- A. inseminacja domaciczna,
- B. zapłodnienie pozaustrojowe,
- C. docytoplazmatyczne wstrzykiwanie plemników,
- D. pobieranie plemników z najądrzy

Zadanie 0.

Międzynarodowy Kodeks Etyki dla Położnych wydany został przez:

- A. Światową Organizację Zdrowia,
- B. Międzynarodową Radę Pielęgniarek,
- C. Międzynarodowe Stowarzyszenie Położnych,
- D. Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci.

Zadanie 0.

Kobieta w wieku rozrodczym na badania rentgenowskie (np. do książeczki zdrowia) powinna zgłosić się:

- A. w czasie miesiączki,
- B. w połowie cyklu miesięczkowego,
- C. pod koniec cyklu miesięczkowego,
- D. w dowolnie wybranym dniu.

Zadanie 0.

Położna, która NIE wykonuje zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat, a zamierza podjąć jego wykonywanie ma obowiązek odbyć przeszkolenie, trwające nie dłużej niż:

- A. 1 miesiąc,
- B. 3 miesiące,
- C. 6 miesięcy,
- D. 1 rok.

Zadanie 0.

Czy polskie położne, będące członkami Polskiego Towarzystwa Położnych, mogą należeć do Międzynarodowego Stowarzyszenia Położnych?

- A. tak,
- B. tak, pod warunkiem złożenia stosownej deklaracji i dokonania wpłaty składki członkowskiej,
- C. tak, pod warunkiem złożenia egzaminu ze znajomości języka angielskiego,
- D. nie, polskie położne nie mogą należeć do Europejskiego Stowarzyszenia Położnych.

Zadanie 0.

W jakim wieku człowiek osiąga dojrzałość biologiczną?

- A. pod koniec 1 miesiąca życia,
- B. w wieku 14-16 lat,
- C. w wieku 18-21 lat,
- D. około 25 roku życia.

Zadanie 0.

Planowane zabiegi operacyjne u kobiety korzystnie jest wykonywać:

- A. w czasie miesiączki,
- B. bezpośrednio po miesiączce,
- C. w połowie cyklu miesięczkowego,
- D. tuż przed miesiączką.

Zadanie 0.

Płeć człowieka genetycznie ustala się:

- A. w momencie zapłodnienia,
- B. w 3 miesiącu życia wewnątrzmacicznego,
- C. w drugiej połowie ciąży,
- D. pod koniec ciąży.

Zadanie 0.

Prawo kobiet ciężarnych i dzieci do bezpłatnej opieki zdrowotnej w Polsce zostało określone w:

- A. Ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej,
- B. Kodeksie Etyki Lekarskiej,
- C. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
- D. Kodeksie pracy.

Zadanie 0.

Menopauza, to ostatnia w życiu kobiety miesiączka, po której następuje co najmniej:

- A. 3 miesięczna przerwa,
- B. 6 miesięczna przerwa,
- C. 9 miesięczna przerwa,
- D. 12 miesięczna przerwa.

Zadanie 0.

Na podstawie, jakiego badania, najszybciej można rozpoznać wcześniej rozpoczynającą się osteoporozę?

- A. tomografii komputerowej,
- B. wywiadu,
- C. ultrasonografii,
- D. densytometrii.

Zadanie 0.

Śluz o cechach płodnych, pojawiający się w okresie przedowulacyjnym, to śluz:

- A. grudkowy, gęsty,
- B. przezroczysty i ciągliwy, przypominający wyglądem białko jaja kurzego,
- C. białawy, kleisty,
- D. rwący, kłaczkowaty.

Zadanie 0.

Za opóźnione pokwitanie u dziewcząt przyjmuje się wiek powyżej:

- A. 11 roku życia,
- B. 13 roku życia,
- C. 14 roku życia,
- D. 16 roku życia.

Zadanie 0.

Po jakim okresie regularnego współżycia w wyniku, którego nie doszło do zapłodnienia para powinna zgłosić się na pierwszą konsultację medyczną:

- A. po roku regularnego współżycia,
- B. po dwóch latach regularnego współżycia,
- C. po pół roku regularnego współżycia,
- D. po trzech latach regularnego współżycia.

Zadanie 0.

Jednym z odczynów ciążyowych pojawiających się u noworodka jest:

- A. fizjologiczny spadek masy ciała noworodka,
- B. powiększenie gruczołów piersiowych noworodka,
- C. wodniak jądra,
- D. żółtaczka fizjologiczna.

Zadanie 0.

Jednym z tzw. stanów przejściowych w okresie noworodkowym jest krwawienie z narządów płciowych, spowodowane:

- A. zwiększoną podatnością na urazy niedojrzałego nabłonka pochwy,
- B. przedłużającym się II okresem porodu w porodzie miednicowym,
- C. zmniejszeniem stężenia estrogenów matczynych,
- D. wysokim stężeniem estrogenów matczynych.

Zadanie 0.

Przy wadach rozwojowych pochwy mogą występować wady wewnętrznych narządów płciowych, dlatego w celu oceny tych narządów należy wykonać:

- A. histerosalpingografię,
- B. Rtg jamy brzusznej,
- C. histeroskopię,
- D. laparoskopię i pobrać wycinki z gonad.

Zadanie 0.

Na rozwój gruczołów piersiowych u dziewczynki w okresie przedpokwitaniowym wpływa coraz większe stężenie hormonów:

- A. estrogenowych,
- B. progesteronu,
- C. androgenowych,
- D. tyroksyny.

Zadanie 0.

W profilaktyce osteoporozy NIE jest stosowana dieta:

- A. wysokobiałkowa,
- B. wysokokaloryczna,
- C. niskosodowa,
- D. bogata w witaminy i sole mineralne.

Zadanie 0.

Dla której fazy w cyklu płodności charakterystyczne jest maksymalne wydzielanie estrogenów i obecność przejrzystego, obfitego śluzu szyjkowego?

- A. menstruacyjnej,
- B. względnie płodnej,
- C. płodnej,
- D. całkowicie niepłodnej.

Zadanie 0.

Jednym z przeciwwskazań do inseminacji homologicznej są:

- A. choroby dziedziczne np. hemofilia,
- B. nadciśnienie tętnicze,
- C. palenie tytoniu przez kobietę,
- D. otyłość.

Zadanie 0.

Wady wrodzone macicy najczęściej rozpoznawane są:

- A. w wieku dziecięcym,
- B. w okresie dojrzewania,
- C. w okresie dojrzałości płciowej,
- D. zaraz po porodzie.

Zadanie 0.

Posługując się metodą termiczną, kobieta może określić w cyklu miesięczkowym:

- A. początek i koniec okresu płodności,
- B. tylko początek okresu płodności,
- C. tylko koniec okresu płodności,
- D. nie może wyznaczyć w ogóle okresu płodności.

Zadanie 0.

Do najczęstszych przyczyn niepłodności męskiej należą:

- A. infekcje,
- B. hipogonadyzm,
- C. żylaki powrózka nasiennego,
- D. niepłodność idiopatyczna.

Zadanie 0.

Najczęstszym powodem niepłodności u mężczyzn jest:

- A. mniejsza ilość plemników w ejakulacji i mniejsza ich żywotność,
- B. niedrożność dróg wyprowadzających nasienie,
- C. zaburzenie wzwodu członka,
- D. zaburzenie wytrysku nasienia.

Zadanie 0.

Które z wymienionych objawów NIE należą do funkcji progesteronu?

- A. podwyższa temperaturę ciała,
- B. wzmacnia diurezę,
- C. zwiększa wydalanie wapnia i fosforu,
- D. korzystnie wpływa na układ sercowo-naczyniowy.

Zadanie 0.

Wskaźnik Pearl jest to:

- A. odsetek niepowodzeń w grupie 100 kobiet stosujących daną metodę przez okres jednego roku,
- B. odsetek objawów ubocznych stosowanej antykoncepcji u 100 kobiet,
- C. odsetek kobiet, u których dana metoda antykoncepcyjna okazała się skuteczna,
- D. odsetek niepowodzeń w grupie 100 kobiet stosujących daną metodę przez cały okres rozrodczy.

Zadanie 0.

Gonadalne rzekome przedwczesne dojrzewanie płciowe jest wywołane:

- A. hormonalnie czynnymi guzami jajnika,
- B. czynnikami jatrogennymi,
- C. długotrwałym stosowaniem estrogenów,
- D. przez nieznane czynniki.

Zadanie 0.

Osoby chore na jadłowstręt psychiczny:

- A. nie odczuwają głodu,
- B. mają poczucie choroby,
- C. odczuwają satysfakcję z powodu utraty masy ciała,
- D. są zmartwione z powodu utraty masy ciała.

Zadanie 0.

Za uwalnianie gonadotropin odpowiedzialna jest gonadoliberyna produkowana przez:

- A. jajnik,
- B. podwzgórze,
- C. przedni płat przysadki mózgowej,
- D. tylny płat przysadki mózgowej.

Zadanie 0.

Które twierdzenie w odniesieniu do okresu okołomenopauzalnego jest prawdziwe?

- A. okres okołomenopauzalny rozpoczyna się u kobiety od momentu spadku produkcji estrogenów w jajnikach,
- B. kryterium wieku jest decydujące, w naszej szerokości geograficznej jest to 40 lat,
- C. okres okołomenopauzalny zaczyna się wówczas, gdy kobieta zaobserwuje u siebie objawy wypadowe,
- D. wiek nie jest istotny, tym bardziej, że są kobiety, które nie wchodzą w okres okołomenopauzalny tylko od razu w menopauzę.

Zadanie 0.

Rozpoznanie mięśniaków stanowi bezwzględne przeciwwskazanie do podawania:

- A. estrogenów,
- B. progesteronu,
- C. oxytocyny,
- D. żelaza.

Zadanie 0.

Najlepszą metodą diagnostyczną wad rozwojowych macicy u kobiet nieciążarnych jest:

- A. laparotomia,
- B. histerosalpingografia,
- C. test krystalizacji śluzu szyjkowego,
- D. histerektomia.

Zadanie 0.

W przypadku wystąpienia kolejno 3 poronień mówi się o poronieniach:

- A. zagrażających,
- B. nawykowych,
- C. nieuniknionych,
- D. zatrzymanych.

Zadanie 0.

Jakie jest podłoże metrorrhagia juvenilis?

- A. nadczynność kory nadnerczy,
- B. niedomoga ciała żółtego,
- C. nieprawidłowa czynność układu podwzgórze-przysadka-jajnik,
- D. karłowatość przysadkowa.

Zadanie 0.

Prawidłowe pH pochwy u dziewcząt w okresie przedpokwitaniowym, to:

- A. 3-4,
- B. 4-5,
- C. 5-6,
- D. 6-7.

Zadanie 0.

Krwawienie czynnościowe oznacza, że:

- A. istnieje jeszcze nie wykryta przyczyna organiczna,
- B. nie ma żadnych zmian organicznych,
- C. podejrzewa się nowotwór narządu rodnego,
- D. jest to krwawienie pomenopauzalne.

Zadanie 0.

Dominującym objawem ostrego zapalenia pochwy na tle rzęsistkowym są pieniste upławy:

- A. o charakterze śluzowym,
- B. podbarwione na zielono,
- C. o charakterze popłuczyn mięsnych,
- D. koloru mlecznego.

Zadanie 0.

Do którego stopnia klinicznego podziału objawów odnosi się niewielkie gubienie moczu w pozycji stojącej przy dużym wysiłku fizycznym?

- A. 0,
- B. I,
- C. II,
- D. III.

Zadanie 0.

W zespole Turnera zaburzenia w budowie ciała to:

- A. niski wzrost,
- B. wysoki wzrost,
- C. wysokie osadzenie małżowin usznych,
- D. wydłużona szyja.

Zadanie 0.

Prawidłowa liczba par chromosomów somatycznych u zdrowego człowieka, to:

- A. 20,
- B. 21,
- C. 22,
- D. 23.

Zadanie 0.

Przerwanie ciąży obecnie w Polsce może być dokonane przez lekarza, w przypadku gdy:

- A. ciąża jest wynikiem gwałtu,
- B. kobieta ma trudne warunki socjalno-bytowe,
- C. w ciąży jest bardzo młoda dziewczyna,
- D. ciąża komplikuje plany życiowe kobiety.

Zadanie 0.

Histerosalpingografia polega na:

- A. wprowadzeniu do macicy przyrządu umożliwiającego obejrzenie jej wnętrza i stwierdzeniu jej stanu,
- B. wprowadzeniu do macicy i jajowodów środka cieniującego i uwidocznieniu ich na zdjęciach rentgenowskich,
- C. pobraniu z macicy materiału do badania histopatologicznego przy użyciu specjalnej aparatury,
- D. oglądaniu w powiększeniu błony śluzowej macicy, co pozwala na stwierdzenie lub wykluczenie jej stanów patologicznych.

Zadanie 0.

Przed zabiegiem histeroskopii niezbędne są badania:

- A. USG, biocenoza pochwy i rozmaz cytoonkologiczny,
- B. USG, laparoscopia i biopsja endometrium,
- C. biopsja endometrium, HSG i rozmaz cytoonkologiczny,
- D. badania biochemiczne nerkowe, układ krzepnięcia i cytologia.

Zadanie 0.

Przygotowanie pola operacyjnego do operacji plastycznej krocza polega na:

- A. goleniu brzucha i sromu,
- B. wyjąłowieniu pochwy,
- C. założeniu tamponu do pochwy,
- D. goleniu sromu i wyjąłowieniu pochwy.

Zadanie 0.

Badanie wydzieliny z pochwy, w przypadku zapalenia przydatków, najczęściej wskazuje na zakażenie:

- A. gruźlicze,
- B. rzeżączkowe,
- C. rzęsistkowe,
- D. bakteryjne.

Zadanie 0.

Jaką witaminę stosuje się w leczeniu zaniku sromu, a której jednocześnie niedobór odgrywa pewną rolę w powstawaniu raka?

- A. witaminę C,
- B. witaminę E,
- C. witaminę A,
- D. witaminę B.

Zadanie 0.

Pobranie materiału do oceny biocenozy pochwy, zależy od czasu jaki upłynął od:

- A. ostatniego stosunku płciowego,
- B. stosowania płukania pochwy,
- C. ostatniego badania przez pochwę,
- D. wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 0.

Jaki jest charakterystyczny obraz podczas badania USG stosowanego w diagnostyce zaśniadu groniastego?

- A. liście paproci,
- B. plastra miodu,
- C. zamieci śnieżnej,
- D. rozrzuconych koralii.

Zadanie 0.

Objawem klinicznym wstrząsu krwotocznego (z utratą krwi 20-40% objętości krwi krążącej) jest diureza godzinowa wynosząca poniżej:

- A. 30 ml/h,
- B. 50 ml/h,
- C. 60 ml/h,
- D. 70 ml/h.

Zadanie 0.

Czy zakażenie kiłą w okresie ciąży jest groźne dla płodu?

- A. nie, gdyż mechanizmy obronne zabezpieczają kobietę przed zakażeniem kiłą,
- B. nie, nawet gdy dojdzie do zainfekowania matki drobnoustrój nie przeniknie przez barierę łożyskową,
- C. tak, zakażenie jest tylko groźne w trzecim trymestrze ciąży, gdy płód jest już dojrzały,
- D. tak, kiła może być przeniesiona z chorej matki przez łożysko na płód i spowodować jego zakażenie.

Zadanie 0.

W celu oznaczenia chromatyny płciowej, wymaz pobiera się z:

- A. jamy ustnej,
- B. jamy nosowej,
- C. ucha,
- D. odbytu.

Zadanie 0.

W przypadku potwierdzenia hiperprolaktynemii na podstawie kilku powtarzanych badań krwi, konieczne jest wykonanie:

- A. testu z kломifenem,
- B. badania TK, MRI siodełka tureckiego,
- C. kuldocentezy,
- D. wymazów cytohormonalnych z pochwy.

Zadanie 0.

Jaki jest główny objaw ostrego brzucha?

- A. uporczywe wymioty,
- B. ostre bóle brzucha,
- C. niepokój ruchowy,
- D. podwyższona temperatura.

Zadanie 0.

W badaniu mikroskopowym preparatu bezpośrednio pobranego z pochwy można zidentyfikować schorzenie przenoszone drogą płciową:

- A. rzesistkowicę (*trichomonas vaginalis*),
- B. opryszczkę narządów płciowych (*herpes simplex virus*),
- C. zakażenie chlamydią,
- D. zakażenie kiłą (*syphilis*).

Zadanie 0.

W celu szybkiego wykrycia rzesistka pochwowego, najczęściej wykonuje się:

- A. badanie pH pochwy,
- B. rozmaz barwiony,
- C. rozmaz w kropli NaCl,
- D. posiew.

Zadanie 0.

W którym okresie życia kobiety, najbardziej nasilają się objawy obniżenia narządu rodno i wysiłkowego nietrzymania moczu?

- A. dojrzewania,
- B. dojrzałości płciowej,
- C. menopauzy,
- D. dziecięcym.

Zadanie 0.

W okresie dojrzewania dziewcząt źródłem krążących we krwi estrogenów są:

- A. jajniki,
- B. jajniki i tkanka tłuszczowa,
- C. tkanka tłuszczowa,
- D. tkanka mięśniowa.

Zadanie 0.

Badanie kolposkopowe pozwala na ocenę:

- A. nabłonka szyjki macicy,
- B. kanału szyjki macicy,
- C. nabłonka szyjki macicy i kanału szyjki macicy,
- D. nabłonka szyjki macicy, kanału szyjki macicy oraz endometrium.

Zadanie 0.

Infekcja narządu rodno u kobiety z wirusem brodawczaka (HPV) powoduje:

- A. niepłodność,
- B. zapalenie gruczołu Bartholina,
- C. zapalenia węzłów chłonnych pachwinowych,
- D. zmiany dysplastyczne i raka szyjki macicy.

Zadanie 0.

Do zamknięcia przewodu wyprowadzającego gruczołu Bartholina, dochodzi z powodu:

- A. infekcji pochwy,
- B. zbyt intensywnego współżycia płciowego,
- C. niedoboru progesteronu,

D. niedoboru estrogenów.

Zadanie 0.

Które badania diagnostyczne mogły spowodować zapalenie przydatków u kobiety?

- A. pobieranie rozmazów cytohormonalnych,
- B. histerosalpingografia,
- C. ultrasonografia vaginalna,
- D. pobieranie wymazów na posiew z pochwy i kanału szyjki.

Zadanie 0.

Zmiany atroficzne na sromie najczęściej pojawiają się w okresie:

- A. dziecięcym,
- B. dojrzewania,
- C. dojrzałości płciowej,
- D. pomenopauzalnym.

Zadanie 0.

Biaława wydzielina, słabo przylegająca do ścian pochwy naloty są objawem zapalenia:

- A. bakteryjnego,
- B. wirusowego,
- C. pierwotniakowego,
- D. grzybiczego.

Zadanie 0.

W badaniu przesiewowym, w kierunku wirusa HIV, stosowany jest test:

- A. Friedmana,
- B. Nitrazynowy,
- C. Elisa,
- D. Marchettiego.

Zadanie 0.

Kiedy miesiączka opóźnia się ponad dwa tygodnie, a w badaniu ginekologicznym nie ma odchyłeń od stanu prawidłowego, można diagnostykę poszerzyć o:

- A. histeroskopię,
- B. USG,
- C. laparoskopię,
- D. histerosalpingografię.

Zadanie 0.

Zapalenie błony śluzowej macicy jest zakażeniem:

- A. tylko wstępującym,
- B. tylko zstępującym,
- C. wstępującym, z jednym wyjątkiem, którym jest zapalenie gruźlicze,
- D. przede wszystkim zstępującym, z wyjątkiem zapalenia połogowego.

Zadanie 0.

Do wykonania próby Schillera stosowany jest:

- A. błękit metylowy,
- B. roztwór jodu,
- C. roztwór kwasu mlekowego,
- D. roztwór kwasu octowego.

Zadanie 0.

Czy zapalenie błony śluzowej można rozpoznać w badaniu ginekologicznym?

- A. nie można, palpacyjnie nie stwierdza się zmian,
- B. można, macica jest zawsze wtedy powiększona i bolesna,
- C. można, ponieważ krwawienie jest charakterystyczne,
- D. można, stwierdza się wtedy bolesność tylnego sklepienia pochwy.

Zadanie 0.

Zagrożenie zakażeniem narządów płciowych kobiety wynika głównie z:

- A. obciążeń dziedzicznych i rodzinnych skłonności do tego typu chorób,
- B. położenia anatomicznego, funkcji rozrodczej i higieny osobistej,
- C. higieny osobistej i uwarunkowań genetycznych,
- D. żadana z wyżej wymienionych.

Zadanie 0.

Dlaczego unika się zabiegów operacyjnych w okresie miesiączki?

- A. zmniejszona odporność,
- B. zaburzone procesy gojenia,
- C. zwiększona utrata krwi,
- D. utrudnione utrzymanie higieny po operacji.

Zadanie 0.

W najbardziej wiarygodny sposób można rozpoznać ciążę ekotopową, na podstawie:

- A. objawów klinicznych,
- B. badania ginekologicznego,
- C. testu ciążowego w moczu,
- D. testu b HCG w surowicy krwi.

Zadanie 0.

Jakie są następstwa zakrzepicy żył głębokich?

- A. zawał serca,
- B. zator tętnicy płucnej lub zawał płuc,
- C. obrzęk płuc,
- D. obrzęk mózgu.

Zadanie 0.

W okresie andropauzy występuje niedobór:

- A. estrogenów,
- B. androgenów,
- C. folitropiny (FSH),
- D. lutropiny (LH).

Zadanie 0.

W trakcie zbliżenia seksualnego występują kolejno fazy:

- A. pobudzenie, plateau, orgazm, odprężenie,
- B. pobudzenie, orgazm, plateau, odprężenie,
- C. pobudzenie, orgazm, odprężenie,
- D. pobudzenie, plateau I, orgazm, plateau II, odprężenie.

Zadanie 0.

Dla zmniejszenia uczucia suchości pochwy w czasie współżycia u 55-letniej kobiety można zastosować:

- A. estrogenoterapię miejscową (dopochwową),
- B. zmianę technik współżycia,
- C. psychoterapię,
- D. leczenie ginekologiczne.

Zadanie 0.

Ekshibicjonizm to:

- A. potrzeba eksponowania narządów płciowych obcym, nieoczekującym tego osobom,
- B. potrzeba eksponowania narządów płciowych dzieciom,
- C. rodzaj zaburzenia osobowości, charakteryzujący się potrzebą koncentracji uwagi otoczenia na sobie,
- D. skłonność do obnażania się za pieniądze (np. striptease).

Zadanie 0.

W Polsce NIE jest karana za prostytutkę osoba, która:

- A. nakłania do prostytutki i czerpie z tego korzyści,
- B. sama dopuszcza się do prostytutki,
- C. dla własnych korzyści materialnych zmusza do prostytutki,
- D. dla własnych korzyści ułatwia prostytutkę.

Zadanie 0.

Na temat współżycia płciowego w okresie ciąży, należy rozmawiać z partnerami:

- A. którzy przyznają się do takich problemów,
- B. którzy w przeszłości mieli już niepowodzenia położnicze,
- C. u których ciąża jest powikłana,
- D. wszystkimi oczekującymi narodzin dziecka.

Zadanie 0.

Receptory zmysłu dotyku, tworzące tzw. strefy erogenne najbardziej skupione są w okolicy:

- A. ust,
- B. narządów płciowych zewnętrznych,
- C. narządów płciowych wewnętrznych,
- D. okolicy szyi.

Zadanie 0.

Jaka jest najbardziej prawdopodobna przyczyna bólu u 55-letniej kobiety w czasie współżycia?

- A. mięśniaki macicy,
- B. związane z wiekiem zmiany atroficzne błony śluzowej pochwy,
- C. opory psychiczne związane z poczuciem mniejszej atrakcyjności,
- D. zbyt długo trwające stosunki.

Zadanie 0.

Czy możliwe jest, aby kobieta po całkowitym usunięciu macicy osiągnęła orgazm w czasie stosunku płciowego?

- A. niemożliwe, ponieważ niemożliwe jest wtedy współżycie płciowe,
- B. niemożliwe, ponieważ przeciwwskazane jest wtedy współżycie płciowe,
- C. możliwe, jeżeli wcześniej też osiągała orgazm,
- D. możliwe, ale bardzo trudne i niebezpieczne.

Zadanie 0.

Najwięcej przypadków kazirodztwa, dotyczy stosunków między:

- A. matką a synem,
- B. matką a pasierbicą,
- C. ojcem a córką,
- D. siostrą a bratem.

Zadanie 0.

Czy badanie w kierunku HIV daje 100% pewności?

- A. jednorazowe nie, ze względu na okienko serologiczne,
- B. tak,
- C. nie u wszystkich daje się wyizolować wirusa,
- D. tak, ale wirus mononukleozy może dawać również pozytywne wyniki.

Zadanie 0.

Niektórzy homoseksualiści są szczególnie niebezpieczni społecznie, ponieważ uwodzą osobników:

- A. z nieprawidłowym popędem płciowym,
- B. uprawiających prostytutkę,
- C. w wieku dojrzałym,
- D. w młodzieńczym wieku.

Zadanie 0.

Czy molestowanie seksualne jest karalne?

- A. nie, gdy wszystko odbywa się w rodzinie,
- B. tak,
- C. nie, jeśli nie doszło do pełnego aktu seksualnego,
- D. nie, jeśli dziecko nie zgłasza pretensji.

Zadanie 0.

Najczęstszą groźbą, jaką stosują przestępcy, wobec ofiary gwałtu, jest:

- A. zabór mienia,
- B. utrata życia,
- C. utrata dobrej opinii społecznej,
- D. utrata zdrowia.

Zadanie 0.

Nadmiernym popędem seksualnym charakteryzuje się:

- A. ekshibicjonizm,
- B. nimfomania,
- C. narratofilia,
- D. gerontofilia.

Zadanie 0.

Prawną dojrzałość, osoba płci męskiej osiąga po ukończeniu:

- A. 16 lat,
- B. 18 lat,
- C. 21 lat,
- D. 24 lat.

Zadanie 0.

Brak krwawienia i odczucia bólu przez kobietę podczas pierwszego stosunku wskazuje, że:

- A. mąż będzie świetnym kochankiem,
- B. na pewno nie była dziewicą,
- C. błona dziewicza była cienka, półksiężycowato-brzeżna i się rozciągnęła,
- D. na pewno nie doszło do pełnego stosunku.

Zadanie 0.

Polucje to objaw:

- A. fizjologiczny,
- B. przedwczesnego dojrzewania płciowego,
- C. zaburzeń w dojrzewaniu płciowym,
- D. charakterystyczny tylko dla okresu dojrzewania.

Zadanie 0.

Jakie jest działanie Viagry?

- A. działa na centralny układ nerwowy - niweluje zahamowania psychiczne,
- B. podnosi poziom testosteronu we krwi,
- C. zwiększa produkcję plemników w jądrach, co powoduje wzrost popędu seksualnego,
- D. działa m.in. na naczynia krwionośne i zakończenia nerwowe prącia, co umożliwia utrzymanie erekcji.

Zadanie 0.

Kiedy współzycie w okresie ciąży jest przeciwwskazane?

- A. zawsze sześć tygodni przed porodem,
- B. gdy zagraża poród przedwczesny,
- C. gdy następuje wypływ mleka,
- D. podczas ruchów płodu.

Zadanie 0.

Odległą konsekwencją doznanego przez kobietę gwałtu może być:

- A. depresja psychiczna,
- B. gniew,
- C. pobudliwość psychiczna,
- D. pobudliwość seksualna.

Zadanie 0.

Czy w Polsce obrzezanie jest dopuszczalne?

- A. nie, gdyż okalecza to chłopców na całe życie,
- B. oczywiście, gdy wymaga tego religia lub jest to działanie terapeutyczne,
- C. jest zalecane, ze względu na aspekty higieniczne,
- D. jest zabronione ustawowo.

Zadanie 0.

Rekonstrukcję pochwy u dziewczynki najlepiej wykonać:

- A. do 2 miesiąca życia,
- B. do 2-go roku życia,
- C. przed rozpoczęciem współżycia płciowego,
- D. w wieku przedszkolnym.

Zadanie 0.

W pierwszej kolejności, człowiek osiąga dojrzałość:

- A. seksualną,
- B. społeczną,
- C. biologiczną,
- D. uczuciową.

Zadanie 0.

Czy libido kobiety zależne jest od cyklu miesięcznego?

- A. nie,
- B. tak, największe potrzeby ma kobieta w okresie okołooowulacyjnym,
- C. tak, ale u każdej kobiety indywidualnie,
- D. tak, największe potrzeby mają kobiety tuż przed i tuż po miesiączce.

Zadanie 0.

Czy w Polsce pedofilia jest karalna?

- A. nie, gdyż jest to choroba psychiczna,
- B. tak,
- C. nie, o ile dziecko nie zostało skrzywdzone fizycznie,
- D. tylko w wypadku pełnego aktu płciowego.

Zadanie 0.

Średni wiek inicjacji seksualnej młodzieży polskiej w ostatnim dwudziestolecu, w porównaniu z okresem wcześniejszym:

- A. uległ obniżeniu,
- B. uległ podwyższeniu,
- C. nie zmienił się,
- D. bardziej wahał się.

Zadanie 0.

Która z niżej podanych diet zwiększa ryzyko występowania raka jajnika?

- A. z małą zawartością sodu,
- B. z dużą zawartością tłuszczów,
- C. z małą zawartością białka,
- D. z dużą zawartością węglowodanów.

Zadanie 0.

Które czynniki NIE mają wpływu na zapadalność młodych kobiet na raka szyjki macicy?

- A. wczesne rozpoczęcie życia płciowego,
- B. nowotwory w najbliższej rodzinie,
- C. częsta zmiana partnerów seksualnych,
- D. dieta bogata w tłuszcze.

Zadanie 0.

Za pozytywny efekt leczenia chemioterapeutycznego uznaje się całkowitą lub częściową remisję. Remisja częściowa oznacza:

- A. kompletne zniknięcie zmian nowotworowych oraz wszystkich objawów choroby na okres nie krótszy niż 4 tygodnie,
- B. zmniejszenie guza o połowę, poprawę stanu ogólnego pacjentki,
- C. zmniejszenie guza w 70% co poprawia komfort życia pacjentki,
- D. cofnięcie się zmian nowotworowych na okres 2 lat.

Zadanie 0.

W przeddzień leczenia metodą brachyterapii, chora jest informowana o:

- A. sposobie zachowania się podczas odwiedzin bliskich, diecie, wypróżnianiu,
- B. izolacji w trakcie leczenia, pozycji, diecie, komunikowaniu się z otoczeniem,
- C. konieczności zmiany pozycji podczas stosowania leczenia,
- D. konieczności zachowania ciszy i niemożności kontaktowania się z otoczeniem.

Zadanie 0.

Jakie cechy zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia nowotworu jajnika?

- A. późne dojrzewanie płciowe, wczesna menopauza, małodzietność, nieregularne, skąpe miesiączki,
- B. wczesne dojrzewanie płciowe, późna menopauza, wielodzietność, obfite miesiączki,
- C. wczesne dojrzewanie płciowe, wielodzietność, brak karmienia piersią,
- D. późne dojrzewanie płciowe, wielodzietność, wydłużone, obfite miesiączki, późna menopauza, antykoncepcja hormonalna.

Zadanie 0.

W jakim celu zachęca się chore po mastektomii do głębokiego kaszlu i wykonywania głębokich oddechów?

- A. lepszego odpływanego wydzieliny z rany pooperacyjnej,
- B. odkształcenia zalegającej wydzieliny w oskrzelach,
- C. zmniejszenia dolegliwości bólowych,
- D. zmniejszenia ucisku na klatkę piersiową i przekrwienia płuc.

Zadanie 0.

Co to są ksenoestrogeny syntetyczne?

- A. wolne estrogeny endogenne,
- B. nieprawidłowa frakcja estrogenów,
- C. syntetyczne substancje o działaniu naśladującym estrogeny,
- D. wadliwie zsyntetyzowane w organizmie estrogeny.

Zadanie 0.

Po operacyjnym leczeniu zaśniadu groniastego niszczącego profilaktycznie stosuje się:

- A. antybiotyki,
- B. radioterapię,
- C. hormony sterydowe,
- D. cytostatyki.

Zadanie 0.

Która metoda antykoncepcji jest przeciwwskazana po ewakuacji zaśniadu groniastego?

- A. prezerwatywa,
- B. spirala,
- C. antykoncepcja hormonalna,
- D. kapturek naszyjkowy.

Zadanie 0.

W jakim okresie cyklu miesięczkowego wykonuje się samobadanie piersi?

- A. 2-3 dni przed miesiączką,
- B. w 2-3 dniu miesiączki,
- C. 2-3 dni po miesiączce,
- D. czas badania jest obojętny.

Zadanie 0.

Rak sutka u młodych kobiet jest najczęściej:

- A. spowodowany hiperestrogenizmem,
- B. spowodowany hipoestrogenizmem,
- C. związany z wadą wrodzoną sutka,
- D. związany z defektem genetycznym.

Zadanie 0.

Jakie leczenie wskazane jest u kobiety, u której stwierdzono zmiany dysplastyczne w nabłonku szyjki macicy zaliczane do CIN III?

- A. leczenie przeciwzapalne,
- B. konizacja szyjki macicy lub wycięcie części szyjki,
- C. hysterectomia radykalna,
- D. hysterectomia i chemioterapia.

Zadanie 0.

Który z poniższych objawów może świadczyć o bardzo bliskiej śmierci (towarzyszy umieraniu)?

- A. charczący oddech, splątanie, pobudzenie ruchowe,
- B. dysfunkcje zwieraczy, duszność, nudności, wymioty,
- C. "zimny pot", czkawka, ôskubanie", czyli mimowolne wykonywanie tych samych ruchów,
- D. wszystkie powyższe.

Zadanie 0.

Największe znaczenie w rozpoznaniu raka endometrium ma pobranie materiału do badania metodą:

- A. aspiracji z jamy macicy,
- B. płukania jamy macicy,
- C. wyłżeczki jamy macicy,
- D. wymazu z ujścia szyjki macicy.

Zadanie 0.

Czy istnieje ryzyko zachorowania na raka drugiej piersi u 30-letniej kobiety po mastektomii?

- A. nie,
- B. tak, większe, niż u zdrowych kobiet (nie z grup ryzyka),
- C. tak, ale mniejsze, niż u zdrowych kobiet (nie z grup ryzyka),
- D. tak, ale takie samo jak u zdrowych kobiet nie obciążonych ryzykiem.

Zadanie 0.

Okres preterminalny to:

- A. faza choroby, w której występuje nieodwracalne pogorszenie ogólnego stanu chorego,
- B. ostatnia faza choroby obejmująca kilka ostatnich dni lub godzin życia chorego,
- C. faza, w której ustała możliwość dalszego przedłużania życia chorego, ale jest on w jeszcze dość dobrym stanie ogólnym,
- D. okres, w którym występują poważne zakłócenia w stanie ogólnym fizycznym i psychicznym chorego.

Zadanie 0.

Do wystąpienia raka szyjki macicy NIE przyczynia się:

- A. wczesne rozpoczęcie życia płciowego,
- B. nieregularne miesiączki,
- C. częsta zmiana partnerów seksualnych,
- D. zapalenie szyjki macicy.

Zadanie 0.

Jakie badanie będzie wykonane w pierwszej kolejności u 26-letniej kobiety, która znalazła u siebie w piersi niewielki guzek?

- A. USG piersi,
- B. mammografia,
- C. biopsja gruboigłowa,
- D. histopatologia.

Zadanie 0.

W przypadku braku apetytu u pacjentki poddanej chemioterapii najlepszym postępowaniem jest:

- A. proponowanie posiłków o zdecydowanym smaku, ostro przyprawionych np. czosnkiem,
- B. ograniczenie spożycia płynów,
- C. wyjaśnienie chorej jak ważna jest racjonalna dieta,
- D. zachęcenie rodziny do dostarczania chorej ulubionych domowych potraw.

Zadanie 0.

W wyniku badania mammograficznego u kobiety stwierdzono drobne zwapnienia. Badaniem palpacyjnym nie wybadano w gruczole sutkowym żadnych zmian. Dalsze rozpoznanie powinno opierać się na:

- A. badaniu histopatologicznym wyciętego guza,
- B. badaniu powtórным mammografii za miesiąc,
- C. punkcji cienkoigłowej,
- D. prześwietleniu Rtg.

Zadanie 0.

Od czego zależy rodzaj terapii w przypadku rozpoznania raka szyjki macicy?

- A. od preferencji lekarza,
- B. od życzenia kobiety i jej wiary w określony sposób leczenia,
- C. od stopnia zaawansowania choroby nowotworowej,
- D. od budowy morfologicznej nowotworu.

Zadanie 0.

Uszkodzenia popromienne późne po stosowaniu radioterapii w obrębie jamy brzusznej objawiają się najczęściej:

- A. obrzękiem i przekrwieniem napromieniowanej okolicy,
- B. uszkodzeniem skóry w miejscu napromieniowania,
- C. dolegliwościami bólowymi miejsc poddanych radioterapii,
- D. popromiennym zapaleniem odbytnicy lub uszkodzeniem układu moczowego.

Zadanie 0.

Obecnie istnieje nowy system, który oprócz zmian zaliczanych do CIN I-III, zawiera obrazy morfologiczne, w przypadku infekcji wirusem HPV. jest to system:

- A. Papanicolau,
- B. Bethesda,
- C. Richardsona,
- D. TNM.

Zadanie 0.

Substancjami kontrastującymi stosowanymi podczas kolposkopii są:

- A. 76 % spirytus vini, 10% formalina,
- B. formalina, płyn Lugola,
- C. noradrenalina, 76 % spirytus salicylowy, kwas mlekowy,
- D. płyn Lugola, wodny roztwór kwasu mlekowego.

Zadanie 0.

Który dzień w cyklu miesięczkowym kobiety określamy dniem szczytu śluzu szyjkowego?

- A. trzeci kolejny dzień występowania śluzu rozciągliwego, śliskiego, oleistego,
- B. ostatni dzień, w którym śluz był śliski, przejrzysty, oleisty, rozciągliwy,
- C. następny dzień po wystąpieniu śluzu śliskiego, przejrzystego, oleistego, rozciągliwego,
- D. następny dzień po ustąpieniu śluzu śliskiego, przejrzystego, oleistego, rozciągliwego.

Zadanie 0.

Czego NIE należy stosować w zwalczaniu bólu w chorobie nowotworowej?

- A. doboru leku,
- B. doboru dawki leku,
- C. podawania leku wtedy, gdy ból się pojawi,
- D. stałego rytmu podawania leku.

Zadanie 0.

Jakie cechy brane są pod uwagę w klasyfikacji stopnia zaawansowania raka gruczołu piersiowego?

- A. wielkość guza; jego stosunek do skóry, ściany klatki piersiowej; stan zajęcia węzłów chłonnych; obecność lub brak przerzutów,
- B. rodzaj komórek nowotworowych; wielkość jąder komórkowych; intensywność wybarwienia,
- C. makroskopową charakterystykę zmiany (polip, naciek, owrzodzenie, brodawka, guz),
- D. stopień zajęcia węzłów chłonnych; rozrost i umiejscowienie zmian w węzłach chłonnych.

Zadanie 0.

Częstość występowania raka endometrium macicy u kobiet zwiększa się po:

- A. 30 roku życia,
- B. 40 roku życia,
- C. 50 roku życia,
- D. 60 roku życia.

Zadanie 0.

Metodą leczenia dysplazji szyjki macicy z wyboru jest:

- A. elektrokoagulacja,
- B. elektrokonizacja,
- C. resekcja szyjki macicy,
- D. resekcja macicy.

Zadanie 0.

Która z wymienionych sytuacji jest przeciwwskazaniem do wykonania badania drożności jajowodów?

- A. występowanie stanu zapalnego w narządzie rodnym,
- B. znajdowanie się pacjentki w pierwszej fazie cyklu miesięczkowego,
- C. zbliżająca się owulacja,
- D. nieregularne miesiączki.

Zadanie 0.

Raka jajowodu można rozpoznać wykonując badanie:

- A. kliniczne,
- B. cytoonkologiczne,
- C. histopatologiczne,
- D. ultrasonograficzne.

Zadanie 0.

Opis cytologiczny Bethesda poza oceną nabłonka płaskiego polega na ocenie:

- A. mikrobiologicznej w tym wirusologicznej,
- B. komórek gruczołowych i jakości pobranego rozmazu,
- C. wirusologicznej w kierunku zakażenia brodawczakiem ludzkim,
- D. jakości rozmazu, ocenie komórek gruczołowych oraz ocenie mikrobiologicznej w tym wirusologicznej.

Zadanie 0.

Którą z definicji uznasz za definicję stresu?

- A. reakcja organizmu na stawiane wymagania,
- B. sytuacja trudna,
- C. relacja między naciskami otoczenia a możliwościami i umiejętnościami radzenia sobie w sytuacji trudnej,
- D. wszystkie wymienione.

Zadanie 0.

Do źródeł stresu zaliczysz:

- A. miejsce pracy i pełnione funkcje,
- B. życie rodzinne i konstrukcje psychiczną,
- C. organizm - stan zdrowia,
- D. wszystkie wymienione.

Zadanie 0.

Celem stosowania tej metody w nauczaniu jest wypracowanie jak największej ilości twórczych i niekonwencjonalnych rozwiązań w jak najkrótszym czasie.

Opis ten charakteryzuje:

- A. pogadankę,
- B. instruktaż,
- C. metodę przypadków,
- D. burzę mózgów.

Zadanie 0.

Umiejętności prowadzenia i uczestniczenia w dyskusji są niezbędne jeżeli na zajęciach wykorzystujemy:

- A. wykład informacyjny, dyskusję panelową, burzę mózgów,
- B. metodę sytuacyjną, burzę mózgów, dyskusję wielokrotną,
- C. dyskusję panelową, pogadankę, opowiadanie,
- D. instruktaż, dyskusję okrągłego stołu, wykład problemowy.

Zadanie 0.

Socjologiczna koncepcja zdrowia, koncentruje się na:

- A. profilaktyce i walce z chorobą,
- B. promocji zdrowia i walce z chorobą,
- C. zaspokajaniu potrzeb zdrowotnych populacji,
- D. życiu codziennym całej populacji, a nie tylko na ludziach znajdujących się w sytuacji zagrożenia chorobą.

Zadanie 0.

Zmiana usytuowania społecznego osoby chorej, która oznacza ograniczenie kontaktów społecznych, to:

- A. marginalizacja społeczna,
- B. rola społeczna,
- C. sytuacja zdrowotna,
- D. deprywacja społeczna.

Zadanie 0.

Pielęgniarki i położne ponoszą odpowiedzialność:

- A. cywilną,
- B. karną,
- C. zawodową,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.

Zgodnie z treścią Ustawy o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, sprzeciw na pobranie komórek, tkanek i narządów ze zwłok ludzkich można wyrazić za życia w formie:

- A. wpisu w centralnym rejestrze sprzeciwów na pobranie komórek, tkanek i narządów ze zwłok ludzkich,
- B. oświadczenia pisemnego zaopatrzonego we własnoręczny podpis,
- C. oświadczenia ustnego złożonego w obecności co najmniej dwóch świadków, pisemnie przez nich potwierdzonego,
- D. wszystkich powyższych możliwości.

Zadanie 0.

Proces przekazywania uprawnień nazywa się:

- A. więzią służbową,
- B. jednością kierownictwa,
- C. podziałem pracy,
- D. delegowaniem.

Zadanie 0.

Jaki jest pierwszy etap procesu planowania?

- A. przypisywanie odpowiedzialności,
- B. ocena rezultatów,
- C. określenie celów,
- D. ustalenie harmonogramu pracy.

Zadanie 0.

Jakość systemu opieki zdrowotnej może być oceniana w zakresie:

- A. struktury,
- B. kryteriów,
- C. wyniku,
- D. prawidłowa odpowiedź A i C.

Zadanie 0.

W całościowym podejściu do zarządzania jakością (Total Quality Management) w podmiocie leczniczym, klientem jest:

- A. pacjent,
- B. pacjent i jego rodzina,
- C. pacjent, jego rodzina oraz lekarze i pielęgniarki,
- D. pacjent, jego rodzina, lekarze, pielęgniarki i położne, inni fachowi i niefachowi pracownicy, studenci, towarzystwa, grupy pomagające pacjentowi po opuszczeniu podmiotu leczniczego.

Zadanie 0.

Polityka zdrowotna państwa ma na celu przede wszystkim:

- A. budowanie programów promocyjnych,
- B. ochronę zdrowia najzamożniejszych,
- C. wylansowanie nowych kierunków działań,
- D. ustalenie i realizację priorytetowych celów zdrowotnych w skali państwa.

Zadanie 0.

Według koncepcji pól Lalonde'a, do czynników warunkujących zdrowie jednostki należy/ą:

- A. styl życia, ochrona zdrowia, środowisko i czynniki genetyczne,
- B. jakość opieki zdrowotnej,
- C. wysokość środków finansowych przeznaczonych na ten cel,
- D. system opieki zdrowotnej.

Zadanie 0.

Jaka organizacja wytycza główne kierunki polityki zdrowotnej w świecie mające odzwierciedlenie w narodowych programach strategicznych?

- A. Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO),
- B. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO),
- C. Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG),
- D. Unia Europejska (UE).

Zadanie 0.

Do podstawowych objawów odwodnienia u dzieci należą:

- A. suchość jamy ustnej i języka, zapadnięte gałki oczne i wolne rozprostowywanie się fałdu skórnoego,
- B. czerwone śluzówki jamy ustnej, rozszerzenie źrenic i wiotka skóra,
- C. obłożony język, zwężenie źrenic i świąd skóry,
- D. szary cień wokół ust, prawidłowo napięte gałki oczne i zaczerwienienie skóry.

Zadanie 0.

Cechą wskazującą świeży zawał serca w zapisie EKG jest/są:

- A. wysokie i ostre załamki T,
- B. uniesienie odcinka ST,
- C. głębokie załamki Q,
- D. odwrócone załamki T.

Zadanie 0.

Czynnikiem predysponującym do zapalenia żył głębokich, jest:

- A. poród przeżyty w ostatnim czasie,
- B. stosowanie hormonalnych środków antykoncepcyjnych,
- C. znaczna otyłość,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.

W przewlekłych chorobach płuc, przebiegających z hipoksją, paznokcie są:

- A. pokryte dołkami,
- B. naznaczone białymi przebarwieniami,
- C. zaokrąglone i wypukłe,
- D. łamliwe i kruche.

Zadanie 0.

Jako tachypnoe u noworodków w pierwszych dniach życia określa się stan, gdy ilość oddechów wynosi powyżej:

- A. 20 oddechów/min,
- B. 40 oddechów/min,
- C. 60 oddechów/min,
- D. 80 oddechów/min.

Zadanie 0.

Termin spodziectwo, określa:

- A. nieprawidłowe ujście cewki moczowej u mężczyzn,
- B. obecność powiększonych gruczołów piersiowych u mężczyzn,
- C. niemożność odprowadzenia napletka,

D. brak jąder w worku mosznowym.

Zadanie 0.

Do przyczyn wstrząsu hipowolemicznego NIE należy:

- A. krwotok, oparzenie,
- B. ostra infekcja,
- C. biegunka, wymioty,
- D. niedrożność jelit.

Zadanie 0.

Objawem patologicznym w badaniu ogólnym moczu w pierwszym tygodniu życia noworodka urodzonego przedwcześnie jest:

- A. leukocyturia,
- B. białkomocz (do 30 mg%),
- C. łagodny cukromocz,
- D. wysokie stężenie kwasu moczowego.

Zadanie 0.

Podczas karmienia piersią u noworodka mogą wystąpić problemy oddechowe, najczęściej spowodowane:

- A. nieprawidłowym ułożeniem noworodka do karmienia,
- B. niedrożnością nosa,
- C. niedojrzałością tkanki płucnej,
- D. nie wykształceniem się surfaktantu.

Zadanie 0.

Objaw Chełmońskiego wykorzystywany w trakcie badania jamy brzusznej, polega na:

- A. zahaczeniu kciukiem dolnego płata wątroby,
- B. szybkim oderwaniu palców badającego od jamy brzusznej,
- C. wstrząsaniu okolic wątroby,
- D. przemieszczaniu gazów w jelicie grubym.

Zadanie 0.

Prawidłowym zachowaniem społecznym noworodka jest stan, w którym:

- A. uspokaja się, kiedy jest brany na ręce,
- B. uspakaja się kiedy widzi matkę,
- C. uśmiecha się kiedy matka przystawia pierś do karmienia,
- D. śpi 23 godziny na dobę.

Zadanie 0.

Dobowe zapotrzebowanie na płyny, zdrowego niemowlęcia o wadze do 10 kg, wynosi:

- A. 50-100ml/kg masy ciała,
- B. 100-150ml/kg masy ciała,
- C. 150-200ml/kg masy ciała,

D. 200-250ml/kg masy ciała.

Zadanie 0.

U osoby dorosłej doszło do zatrzymania krążenia, wezwano pogotowie i oczekiwano na jego przyjazd (nie prowadzono żadnych czynności ratowniczych), przybyły po 6 minutach zespół ratownictwa stwierdza migotanie komór. W tej sytuacji w pierwszej kolejności należy:

- A. bezzwłocznie wykonać trzy cykle defibrylacji,
- B. wykonać kardiowersję elektryczną,
- C. przez 2 minuty poprowadzić reanimację krążeniowo-oddechową, a następnie wykonać defibrylację,
- D. wykonać defibrylację energią 150 J i niezwłocznie podjąć pośredni masaż serca.

Zadanie 0.

W czasie akcji resuscytacyjnej prowadzonej przez dwie osoby, proporcja uciskania klatki piersiowej i oddechów ratowniczych u osoby dorosłej wynosi:

- A. 15 ucisków/5 wdechów,
- B. 10 ucisków/2 wdechy,
- C. 5 ucisków/1 wdech,
- D. 30 ucisków/2 wdechy.

Zadanie 0.

Objaw Blumberga, polega na:

- A. stwierdzeniu bolesności przy opukiwaniu w okolicy lędźwiowej,
- B. braku reakcji źrenic na światło,
- C. bolesności uciskowej przy lekkim, powierzchownym dotyku powłok brzusznych,
- D. bolesności uciskowej przy nagłym oderwaniu ręki silnie uciskającej powłoki brzuszne.

Zadanie 0.

Typowymi objawami w przewlekłej niewydolności żylniej są znaczne obrzęki oraz:

- A. brunatne przebarwienia w okolicy kostek,
- B. owrzodzenie palców,
- C. pogrubienie i pękanie paznokci,
- D. zmniejszone ucieplenie kończyn.

Zadanie 0.

Priorytetowym działaniem w nagłym zatrzymaniu krążenia, w mechanizmie migotania komór, mającego miejsce w warunkach pozaszpitalnych, jest:

- A. defibrylacja elektryczna,
- B. podanie adrenaliny,
- C. ułożenie w pozycji bezpiecznej,
- D. podjęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Zadanie 0.

Najczęściej przejawem procesu patologicznego u noworodka jest obecność żółtaczki w:

- A. 1 dobie, a poziom bilirubiny przekracza 7 mg,
- B. 2 dobie, a poziom bilirubiny przekracza 10 mg,
- C. 3 dobie, a poziom bilirubiny przekracza 12 mg,
- D. 4 dobie, a poziom bilirubiny przekracza 14 mg.

Zadanie 0.

Prawidłowa czynność serca noworodka donoszonego wynosi:

- A. 100-140 uderzeń/minutę,
- B. 110-160 uderzeń/minutę,
- C. 120-160 uderzeń/minutę,
- D. 140-180 uderzeń/minutę.

Zadanie 0.

Zwiększone stężenie PSA w surowicy krwi (powyżej 10 ng/ml), stwierdza się w:

- A. zawale mięśnia sercowego,
- B. raku gruczołu krokowego,
- C. ostrej niedokrwistości,
- D. nadczynności tarczycy.

Zadanie 0.

Po omdleniu kobiety z zaawansowaną ciążą należy ułożyć ją:

- A. w pozycji bocznej ustalonej,
- B. na plecach, unieść jej kończyny dolne pod kątem 60°,
- C. na lewym boku,
- D. na plecach, podkładając wałek pod głowę.

Zadanie 0.

Metodami wsparcia w systemie E. D. Orem są:

- A. wykład, doradztwo,
- B. pogadanka, doradztwo,
- C. zachęcanie, ćwiczenia,
- D. doradztwo, nauczanie, zachęcanie.

Zadanie 0.

Proces pielęgnowania obejmuje kolejno następujące etapy:

- A. wieloetapowość, realizowanie, ocenianie, planowanie,
- B. dynamikę, rozpoznanie, planowanie, ocenianie,
- C. planowanie, ocenianie, realizowanie, rozpoznanie,
- D. rozpoznanie, planowanie, realizowanie, ocenianie.

Zadanie 0.

Połączenie jakich technik badawczych jest szczególnie wskazane w badaniach pielęgniarstwach:

- A. obserwacja (uczestnicząca, dorywcza, kategoryzowana, fotograficzna) oraz ankieta, wywiad, test socjometryczny jako technika sondażu diagnostycznego,
- B. obserwacja uczestnicząca, test socjometryczny oraz wywiad,
- C. obserwacja dorywcza, kategoryzowana oraz test socjometryczny,
- D. różne rodzaje obserwacji.

Zadanie 0.

Zasadniczym źródłem stawiania hipotez jest/są:

- A. własne doświadczenia badacza,
- B. wyniki poprzednio przeprowadzonych badań i przegląd literatury,
- C. przegląd literatury związanej z problemem badań,
- D. wstępne rozpoznanie terenu badań.

Zadanie 0.

Efektom doskonalenia zawodowego pielęgniarzek/położnych jest:

- A. elastyczne podejście do realizacji zadań,
- B. podniesienie poziomu jakości wykonywanych świadczeń pielęgniarstwach,
- C. postawy twórcze i innowacyjność,
- D. wszystkie wymienione.

Zadanie 0.

Aktualny kodeks etyki zawodowej obowiązujący polskie pielęgniarki i położne pochodzi z:

- A. 1991 r.,
- B. 1995 r.,
- C. 2003 r.,
- D. 2005 r.

Zadanie 0.

Folderem w systemie Windows nazywamy:

- A. obrazek zapisany na dysku twardym,
- B. miejsce na dysku do zapisywania plików lub innych folderów,
- C. część systemu operacyjnego,
- D. urządzenie wejściowe komputera.

Zadanie 0.

Plik w polskiej terminologii informatycznej to:

- A. zbiór kart informacyjnych,
- B. zestaw cyfrowych nośników informacji,
- C. jednostka zapisu i przechowywania danych w komputerze,
- D. żadne z powyższych.

Zadanie 0.

Programami służącymi do przetwarzania danych statystycznych, w szczególności obliczania średnich, odchyleń od średnich, korelacji oraz sporządzania tabel i wykresów są:

- A. systemy operacyjne,
- B. edytory tekstu,
- C. bazy danych,
- D. arkusze kalkulacyjne.