

**Zadanie 1.**

Odma podskórna należy do powikłań towarzyszących:

- A. ultrasonografii,
- B. histeroskopii,
- C. laparoskopii,
- D. kontroli jamy macicy.

**Zadanie 2.**

Jakie jest postępowanie, gdy w dziewiątym miesiącu ciąży wystąpi niewielkie krwawienie po stosunku?

- A. spokój i kontakt z lekarzem,
- B. natychmiast wezwać karetkę pogotowia,
- C. w tym okresie ciąży jest to normalne,
- D. obserwacja ruchów płodu przez godzinę.

**Zadanie 3.**

W Narodowym Programie Zwalczenia Chorób Nowotworowych zostały określone, dla populacji polskiej, wytyczne określające zasady wykonywania badań genetycznych oraz profilaktyki w rodzinach wysokiego ryzyka. Badanie stanu genu BRCA1 wykonuje się:

- A. u pacjentek z rozpoznaną chorobą nowotworową piersi i/lub jajnika,
- B. u krewnych pierwszego stopnia, jeśli pacjentka chora na raka piersi i/lub raka jajnika już nie żyje,
- C. u pacjentek chorych na raka piersi tylko we wczesnym stadium zaawansowania klinicznego,
- D. odpowiedź A i B są prawidłowe.

**Zadanie 4.**

W badaniu przesiewowym, w kierunku wirusa HIV, stosowany jest test:

- A. Friedmana,
- B. Nitrazynowy,
- C. Elisa,
- D. Marchettiiego.

**Zadanie 5.**

Której z poniższych cech NIE posiada komórka nowotworowa?

- A. zdolność do mnożenia się,
- B. zdolność do hamowania kontaktowego,
- C. zdolność do przeżycia pojedynczej komórki,
- D. zdolność do produkcji pewnych substancji, które są wytwarzane przez komórki zdrowe (np. produkcja hormonów).

**Zadanie 6.**

Której z wymienionych sytuacji powinna unikać pacjentka cierpiąca na nietrzymanie moczu, wiedząc, że powoduje ona nasilone występowania dolegliwości?

- A. przebywania w zimnie,
- B. przebywania w wysokiej temperaturze,
- C. długotrwałego siedzenia,
- D. leżenia w pozycji na wznak.

**Zadanie 7.**

W wyniku badania mammograficznego u kobiety stwierdzono drobne zwapnienia. Badaniem palpacyjnym nie wybadano w gruczole sutkowym żadnych zmian. Dalsze rozpoznanie powinno opierać się na:

- A. badaniu histopatologicznym wyciętego guza,
- B. badaniu powtórnym mammografii za miesiąc,
- C. punkcji cienkoigłowej,
- D. prześwietleniu Rtg.

**Zadanie 8.**

Prawo kobiet ciężarnych i dzieci do bezpłatnej opieki zdrowotnej w Polsce zostało określone w:

- A. Ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej,
- B. Kodeksie Etyki Lekarskiej,
- C. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
- D. Kodeksie pracy.

**Zadanie 9.**

Osoby chore na jadłowstręt psychiczny:

- A. nie odczuwają głodu,
- B. mają poczucie choroby,
- C. odczuwają satysfakcję z powodu utraty masy ciała,
- D. są zmartwione z powodu utraty masy ciała.

**Zadanie 10.**

Co jest najczęstszą przyczyną czynnościowych krwawień macicznych u młodocianych?

- A. zaburzenia krzepnięcia krwi,
- B. niedojrzałość osi podwzgórzowo-przysadkowej,
- C. niedoczynność przytarczyc,
- D. czynniki psychogenne.

**Zadanie 11.**

Kłykciny kończyste występują w klinicznym stadium zakażenia dróg rodnych wywołanego przez:

- A. chlamydię,
- B. wirusa opryszczki,
- C. mikoplazmy,
- D. wirusa brodawczaka ludzkiego.

**Zadanie 12.**

Wskaż nieprawidłowe kryterium rozpoznania syndromu PCOS:

- A. zaburzenia miesiączkowania,
- B. kliniczne i/lub biochemiczne objawy hiperandrogenizmu,
- C. wielotorbielowata budowa jajników,
- D. zaburzenia libido.

**Zadanie 13.**

Małżeństwo z 2-letnim stażem, współżyją regularnie, ale kobieta w tym okresie nie zaszła w ciążę. Partnerzy nie stosują żadnych metod regulacji poczęć. Czy u tej pary można mówić o niepłodności małżeńskiej?

- A. nie, gdyż jest to zbyt krótki czas regularnego współżycia płciowego,
- B. nie, gdyż w pierwszym okresie współżycia płciowego tylko 50% kobiet zachodzi w ciążę,
- C. tak, ponieważ regularne współżycie płciowe w ciągu dwóch lat powinno prowadzić do zapłodnienia,
- D. nie, ponieważ dopiero po okresie 5 lat regularnego współżycia można postawić taką diagnozę.

**Zadanie 14.**

Rekonstrukcję pochwy u dziewczynki najlepiej wykonać:

- A. do 2 miesiąca życia,
- B. do 2-go roku życia,
- C. przed rozpoczęciem współżycia płciowego,
- D. w wieku przedszkolnym.

**Zadanie 15.**

Ćwiczenia Kegla, to ćwiczenia mięśni:

- A. dna miednicy,
- B. brzucha,
- C. pośladków,
- D. ud.

**Zadanie 16.**

Pochwica jest to:

- A. stały skurcz mięśni pochwy,
- B. nawracający ból narządów płciowych przed stosunkiem,
- C. nawracający lub utrzymujący się mimowolny skurcz mięśni zewnętrznej jednej trzeciej części pochwy, który utrudnia penetrację,
- D. okresowy, mimowolny skurcz mięśni pochwy, penetracja jest możliwa.

**Zadanie 17.**

Jakiej operacji NIE wykonuje się drogą pochwową?

- A. plastyki szyjki macicy,
- B. wyluszczenia guzów jajnika,
- C. wyluszczenia torbieli gruczołu Bartholina,
- D. wycięcia macicy.

**Zadanie 18.**

Która część narządu rodnej kobiety najczęściej ulega zakażeniu gruźlicą?

- A. jajniki,
- B. jajowody,
- C. macica,
- D. pochwa.

**Zadanie 19.**

Konsekwencją przebytego rzeżączkowego zapalenia przydatków, jest:

- A. niemożność donoszenia ciąży,
- B. poród przedwczesny,
- C. niepłodność,
- D. poronienie wczesnej ciąży.

**Zadanie 20.**

Niedorozwinięta macica z hipoplastycznymi jajowodami, obecność dwóch włóknistych pasemek jajnikowych oraz kariotyp 45 XO jest diagnozowany jako:

- A. pseudohermafrodytyzm żeński,
- B. zespół Tunera,
- C. zespół Steina - Leventhala,
- D. dysgenезja typu turnerowskiego.

**Zadanie 21.**

Badania profilaktyczne realizowane w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi, skierowane są do kobiet w przedziale wiekowym:

- A. 50-69 lat,
- B. 45-65 lat,
- C. 40-69 lat,
- D. 35-50 lat.

**Zadanie 22.**

Definicja gwałtu obejmuje każdy kontakt seksualny, do którego dochodzi:

- A. bez świadomej zgody jednej ze stron,
- B. gdy zastosowano przemoc fizyczną,
- C. gdy istniała groźba zastosowania przemocy fizycznej w stosunku do ofiary, jak i innej osoby,
- D. wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

**Zadanie 23.**

Jaka forma przebywania z chorą umierającą jest najwłaściwsza?

- A. wykonywanie ostatnich czynności higienicznych,
- B. częste poprawianie bielizny pościelowej dla wygody,
- C. płacz dla zaakcentowania swojej rozpaczki,
- D. cicha, spokojna obecność.

**Zadanie 24.**

Komórki zwane koilocytami, uwidocznione w badaniu cytoonkologicznym szyjki macicy charakteryzują zakażenie:

- A. wirusem HPV,
- B. rzęsistkiem pochwowym,
- C. wirusem cytomegali (CMV),
- D. chlamydia trachomatis.

**Zadanie 25.**

Do zamknięcia przewodu wyprowadzającego gruczołu Bartholina, dochodzi z powodu:

- A. infekcji pochwy,
- B. zbyt intensywnego współżycia płciowego,
- C. niedoboru progesteronu,
- D. niedoboru estrogenów.

**Zadanie 26.**

Kolposkopia jest to badanie pozwalające na:

- A. wszczęcie leczenia onkologicznego,
- B. uchwycenie przedklinicznych postaci raka szyjki,
- C. określenie struktury komórek,
- D. ocenę morfologiczną nowotworu.

**Zadanie 27.**

Zapalenie błony śluzowej macicy jest zakażeniem:

- A. tylko wstępującym,
- B. tylko zstępującym,
- C. wstępującym, z jednym wyjątkiem, którym jest zapalenie gruźlicze,
- D. przede wszystkim zstępującym, z wyjątkiem zapalenia połogowego.

**Zadanie 28.**

Nadużywanie, których z podanych poniżej składników pokarmowych zwiększa ryzyko zachorowania na raka piersi?

- A. mięso czerwone, pieczywo, alkohol,
- B. tłuszcze, cukier, alkohol,
- C. mocna herbata, mięso, alkohol,
- D. tłuste ryby, kasze, alkohol.

**Zadanie 29.**

Triada objawów sugerujących ciążę pozamaciczną, to:

- A. skurcze macicy, ból, krwawienie lub plamienie,
- B. skurcze macicy, ból, zatrzymanie miesiączki,
- C. ból, krwawienie lub plamienie, zatrzymanie miesiączki,
- D. krwawienie lub plamienie, skurcze macicy, zatrzymanie miesiączki.

**Zadanie 30.**

Do zadań III poziomu opieki perinetalnej należy:

- A. prowadzenie ciąż i porodów wysokiego ryzyka,
- B. leczenie najciężej chorych noworodków oraz nadzór nad ich rozwojem psychoruchowym,
- C. odpowiedzi A i B są prawidłowe,
- D. wszystkie odpowiedzi są błędne.

**Zadanie 31.**

U nieletnich ofiar przemocy seksualnej z penetracją zaleca się przeprowadzenie antybiotykoterapii składającej się z:

- A. ceftriaksonu i azytromycyny,
- B. metronidazolu,
- C. biofuroksymu i cefazolinu,
- D. odpowiedzi A i B są prawidłowe.

**Zadanie 32.**

U nowonarodzonej dziewczynki łechtaczka była przerośnięta a wargi sromowe większe nienaturalnie uwydatnione. Dokładniejsze badanie wykazało wspólne ujście dla cewki moczowej i pochwy. Opisane objawy wskazują, że jest to zespół:

- A. Klinefeltera,
- B. feminizujących jąder,
- C. Turnera,
- D. nadnerczowo-płciowy

**Zadanie 33.**

Przebiecie ciąży jajowodowej często prowadzi do:

- A. zaburzeń cyklu miesięczkowego,
- B. cyklicznie pojawiającego się bólu po stronie operowanej,
- C. wtórnej niepłodności,
- D. zaburzeń seksualnych.

**Zadanie 34.**

Receptory zmysłu dotyku, tworzące tzw. strefy erogenne najbardziej skupione są w okolicy:

- A. ust,
- B. narządów płciowych zewnętrznych,
- C. narządów płciowych wewnętrznych,
- D. okolicy szyi.

**Zadanie 35.**

W pierwszych dobach po operacjach ginekologicznych na stan psychoemocjonalny pacjentek najbardziej wpływa:

- A. pomoc w zmianie pozycji ciała,
- B. zwalczanie bólu pooperacyjnego,
- C. dopilnowanie rytmu snu i odpoczynku,
- D. przekazanie wiedzy o higienie rany pooperacyjnej.

**Zadanie 36.**

Za opóźnione pokwitanie u dziewcząt przyjmuje się wiek powyżej:

- A. 11 roku życia,
- B. 13 roku życia,
- C. 14 roku życia,
- D. 16 roku życia.

**Zadanie 37.**

Jakie preparaty hormonalne stosuje się w przypadku leczenia raka sutka?

- A. hormony przysadki mózgowej,
- B. antyestrogeny i progestageny,
- C. hormony kory nadnerczy,
- D. hormony tyreotropowe.

**Zadanie 38.**

Zachowanie w którym satysfakcja seksualna jest osiągnięta w wyniku kontaktu z przedmiotem lub fragmentem ciała partnera to:

- A. ocieractwo,
- B. oglądactwo,
- C. fetysyzm,
- D. erotomania.

**Zadanie 39.**

Leczenie krwawienia u młodocianych polega na:

- A. zahamowaniu krwawienia, zapobieganiu jego nawrotom i zastosowaniu leczenia hormonalnego,
- B. wyłyżeczkowaniu jamy macicy,
- C. stosowaniu leczenia hormonalnego,
- D. stosowaniu leczenia objawowego.

**Zadanie 40.**

Kiedy matka powinna rozpocząć uświadamianie seksualne dziecka?

- A. poczekać, aż w szkole uświadomią dziecko specjaliści,
- B. przed okresem dojrzewania,
- C. gdy dziecko zacznie pytać - koło 3-4 r.ż.,
- D. nie powinna rozmawiać z dzieckiem na te tematy.

**Zadanie 41.**

Odczynem pojawiającym się tylko u noworodków płci żeńskiej, spowodowanym wpływem hormonów matczynych, jest:

- A. mlecznobiała lub krwista wydzielina w ujściu pochwy,
- B. rumień noworodkowy,
- C. plamy mongolskie,
- D. gorączka fizjologiczna.

**Zadanie 42.**

Większość kobiet osiąga orgazm przez:

- A. stymulację pochwy przy współżyciu,
- B. stymulację piersi,
- C. stymulację pośladków,
- D. pobudzenie łechtaczki.



**Zadanie 43.**

Które zdanie jest nieprawdziwe? Po utracie włosów po chemioterapii kobiecie:

- A. przysługuje darmowa peruka,
- B. odrosną włosy gęściejsze, niż przed chemioterapią,
- C. odrosną włosy podobne, jak włosy sprzed okresu leczenia,
- D. utrata włosów wiąże się z utratą cebulek włosowych.

**Zadanie 44.**

Na utrzymanie fizjologicznego stanu pochwy, NIE ma wpływu:

- A. odczynowość pochwy,
- B. obecność pałeczek kwasu mlekowego,
- C. estrogeny,
- D. Escherichia coli.

**Zadanie 45.**

Gruźlica utajona narządów rodnych, charakteryzuje się występowaniem:

- A. niepłodności pierwotnej,
- B. pianistych, zielonych upławów,
- C. krótkich cykli miesięczkowych,
- D. obfitych krwawień miesięcznych.

**Zadanie 46.**

Konsekwencją stymulacji owulacji u kobiety, może być:

- A. niepłodność,
- B. oziębłość płciowa,
- C. zaburzenie statyki macicy,
- D. ciąża mnoga.

**Zadanie 47.**

Najistotniejszym czynnikiem ryzyka wystąpienia nowotworu gruczołu piersiowego jest:

- A. wysoki poziom estrogenów,
- B. wielodziećność,
- C. wilgotny klimat,
- D. dieta niskokaloryczna.

**Zadanie 48.**

Chora matka NIE może zakazić swojego dziecka rzeżączką, przez:

- A. używanie wspólnych ręczników, gąbki do ciała,
- B. spanie w jednej pościeli,
- C. korzystanie ze wspólnych urządzeń sanitarnych,
- D. sporządzanie i wspólne spożywanie posiłków.

**Zadanie 49.**

Czy w Polsce pedofilia jest karalna?

- A. nie, gdyż jest to choroba psychiczna,
- B. tak,
- C. nie, o ile dziecko nie zostało skrzywdzone fizycznie,
- D. tylko w wypadku pełnego aktu płciowego.

**Zadanie 50.**

Największe ryzyko zachorowania na raka piersi jest u kobiety w wieku:

- A. 45 lat, która nigdy nie była w ciąży,
- B. 35 lat, która urodziła dwoje dzieci,
- C. 65 lat, która urodziła pięcioro dzieci,
- D. 25 lat, która urodziła jedno dziecko.

**Zadanie 51.**

Dla zmniejszenia uczucia suchości pochwy w czasie współżycia u 55-letniej kobiety można zastosować:

- A. estrogenoterapię miejscową (dopochwową),
- B. zmianę technik współżycia,
- C. psychoterapię,
- D. leczenie ginekologiczne.

**Zadanie 52.**

Jakie badanie należy wykonać u kobiety ciężarnej, która nie chorowała na różyczkę lub nie została przeciwko niej uodporniona?

- A. badanie na obecność w surowicy krwi przeciwciał skierowanych przeciwko antygenom wirusa różyczki,
- B. badanie ultrasonograficzne w 18 tygodniu ciąży,
- C. badanie rozmaz cytohormonalny,
- D. badanie radiologiczne.

**Zadanie 53.**

Jaki hormon jest odpowiedzialny za wzrost podstawowej ciepłoty ciała w cyklu miesięczkowym?

- A. progesteron,
- B. estrogeny,
- C. androgeny,
- D. gonadotropina kosmówkowa.

**Zadanie 54.**

Wodobrzusze jest objawem charakterystycznym dla nowotworu:

- A. szyjki macicy,
- B. sromu,
- C. jajników,
- D. macicy.

**Zadanie 55.**

Przygotowując pacjentkę do zabiegu histeroskopii należy wykonać:

- A. test z gonadoliberyną (GnRH),
- B. rtg klatki piersiowej,
- C. biocenozę pochwy,
- D. diagnostyczne wyłyżeczkowanie jamy macicy.

**Zadanie 56.**

Jakie działania na rzecz prewencji raka piersi powinna podejmować położna w swej pracy?

- A. naukę samobadania piersi,
- B. edukację zdrowotną dotyczącą czynników ryzyka zachorowania na raka sutka,
- C. naukę zachowań prozdrowotnych,
- D. wszystkie wyżej wymienione.

**Zadanie 57.**

Hormonem odpowiedzialnym za ukształtowanie II-rzędowych i III-rzędowych kobiecych cech płciowych jest/są:

- A. progesteron,
- B. prolaktyna,
- C. estrogeny,
- D. gonadotropiny.

**Zadanie 58.**

Jakie są przeciwwskazania do hormonalnej terapii zastępczej?

- A. ostre i przewlekłe choroby nerek, depresje psychiczne, niedokrwistość,
- B. zmiany zwyrodnieniowe stawów i mięśni, bóle stawowe, anemia,
- C. choroby zapalne, zakaźne, padaczka, wrzód żołądka i dwunastnicy,
- D. nowotwory estrogenozależne, zakrzepy, zatory, porfiria, ciężkie choroby wątroby.

**Zadanie 59.**

Pojawienie się krwawienia z narządów płciowych u noworodków płci żeńskiej jest skutkiem:

- A. zmniejszenia stężenia estrogenów matczynych,
- B. zwiększenia stężenia estrogenów matczynych,
- C. leków stosowanych przez kobietę w czasie ciąży,
- D. stanów chorobowych noworodka.

**Zadanie 60.**

Postępowaniem z wyboru w zapaleniu przydatków jest:

- A. antybiotykoterapia,
- B. leczenie uzdrowiskowe,
- C. łyżeczkowanie jamy macicy,
- D. rehabilitacja ruchowa.

**Zadanie 61.**

Nabłoniak kosmówkowy daje przerzuty najczęściej do:

- A. nerek,
- B. serca,
- C. kości,
- D. płuc.

**Zadanie 62.**

Rekomendowane metody antykoncepcji dla kobiet z SM, to:

- A. DTA,
- B. Depo-Provera,
- C. prezerwatywa,
- D. odpowiedzi A i C są prawidłowe.

**Zadanie 63.**

W wyborze metody leczenia nadżerki uwzględnia się przede wszystkim:

- A. równowagę hormonalną organizmu,
- B. wrażliwość na leki,
- C. przebyte choroby,
- D. wiek i plany prokreacyjne.

**Zadanie 64.**

W wieku pomenopauzalnym dominującym estrogenem jest:

- A. estradiol,
- B. estriol,
- C. estron,
- D. nie ma dominującego estrogenu.

**Zadanie 65.**

Jednym z najważniejszych celów wczesnego uruchamiania i rehabilitacji pooperacyjnej jest:

- A. oddalenie myśli o cierpieniu,
- B. zwiększenie zadowolenia pacjentki z opieki,
- C. zapobieganie powikłaniom zakrzepowo - zatorowym,
- D. zwiększenie efektywności leczenia.

**Zadanie 66.**

Jakie są pierwsze objawy wrzodziejącego raka sromu?

- A. uporczywy świąd,
- B. krwawienie,
- C. powiększenie węzłów chłonnych pachwinowych,
- D. ból.

**Zadanie 67.**

Liszaj biały rozpoznawany jest na podstawie:

- A. objawów klinicznych,
- B. badań hormonalnych,
- C. badania histopatologicznego,
- D. rozmazu cytologicznego.

**Zadanie 68.**

Jakiej wielkości jest trzon macicy w ciąży szyjkowej?

- A. zgodny z czasem zatrzymania miesiączki,
- B. normalnej wielkości,
- C. nieznacznie powiększony,
- D. mniejszy niż zwykle.

**Zadanie 69.**

Siła pożądania seksualnego ulega następującym modyfikacjom w trakcie cyklu miesiączkowego:

- A. jest większa w fazie folikularnej cyklu,
- B. jest większa tuż przed i po miesiączce,
- C. jest mniejsza w fazie folikularnej cyklu,
- D. nie ulega modyfikacjom.

**Zadanie 70.**

Pod względem częstości występowania u kobiet w Polsce rak szyjki macicy znajduje się na miejscu:

- A. pierwszym,
- B. drugim,
- C. trzecim,
- D. czwartym.

**Zadanie 71.**

W myśl obowiązujących przepisów prawnych w Polsce, położna asystująca lekarzowi podczas legalnego zabiegu przerywania ciąży, czyni to:

- A. z obowiązku,
- B. dobrowolnie,
- C. z przymusu,
- D. z obawy przed zwolnieniem z pracy.

**Zadanie 72.**

Czy położna może wykonać badanie piersi u pacjentki?

- A. nie, powinna skierować pacjentkę do ginekologa,
- B. nie, powinna skierować pacjentkę na mammografię,
- C. nie, położna może wykonać badanie piersi tylko u kobiet przed okresem przekwitania,
- D. tak, położna może wykonać badanie piersi.

**Zadanie 73.**

Prawidłowa liczba par chromosomów somatycznych u zdrowego człowieka, to:

- A. 20,
- B. 21,
- C. 22,
- D. 23.

**Zadanie 74.**

Kolposkopia powinna być wykonana u kobiet:

- A. leczonych hormonalnie,
- B. wykazujących nieprawidłowości w diagnostycznym rozmazie cytologicznym z szyjki macicy i pochwy,
- C. zawsze po leczeniu stanu zapalnego szyjki macicy i pochwy,
- D. zarażonych wirusem HIV.

**Zadanie 75.**

Co powinna zrobić kobieta, gdy zapomniała wziąć tabletkę antykoncepcyjną, a od ostatnio przyjętej dawki minęło ponad 36 godzin?

- A. zażyć i uznać, że nic się nie stało,
- B. zażyć i do końca cyklu stosować dodatkowy środek antykoncepcyjny,
- C. zrezygnować całkowicie z tabletek w danym cyklu,
- D. do końca cyklu przyjmować po dwie tabletki dziennie.

**Zadanie 76.**

Polucje to objaw:

- A. fizjologiczny,
- B. przedwczesnego dojrzewania płciowego,
- C. zaburzeń w dojrzewaniu płciowym,
- D. charakterystyczny tylko dla okresu dojrzewania.

**Zadanie 77.**

Do czynników utrzymujących narządy płciowe w prawidłowym położeniu, NIE należą:

- A. mięśnie i powięź dna macicy,
- B. miednica kostna,
- C. tkanka łączna przymacicz,
- D. więzadła.

**Zadanie 78.**

Ile urlopu macierzyńskiego może wykorzystać pracownica w ciąży przed przewidywaną datą porodu?

- A. 1 tydzień,
- B. co najmniej 3 tygodnie,
- C. nie więcej niż 6 tygodni,
- D. cały przysługujący urlop.

**Zadanie 79.**

Przeprowadzając wywiad z mężczyzną, ukierunkowany na wykluczenie lub potwierdzenie jego niepłodności należy zwrócić uwagę na:

- A. przebyte choroby weneryczne,
- B. przebyte zaburzenia widzenia,
- C. przebyte zaburzenia słuchu,
- D. przebytą we wczesnym dzieciństwie fenyloketonurię.

**Zadanie 80.**

Głównym warunkiem naturalnego zapłodnienia jest:

- A. znajomość cyklu miesięczkowego,
- B. znajomość terminu owulacji,
- C. zdolność do współżycia płciowego,
- D. zdolność okazywania uczuć wyższych.

**Zadanie 81.**

Do powstawania wad wrodzonych narządów płciowych dochodzi najczęściej:

- A. w pierwszych 3 tygodniach po zapłodnieniu,
- B. między 8-10 tygodniem ciąży,
- C. między 14-16 tygodniem ciąży,
- D. w II trymestrze ciąży.

**Zadanie 82.**

Badanie kolposkopowe pozwala na ocenę:

- A. nabłonka szyjki macicy,
- B. kanału szyjki macicy,
- C. nabłonka szyjki macicy i kanału szyjki macicy,
- D. nabłonka szyjki macicy, kanału szyjki macicy oraz endometrium.

**Zadanie 83.**

Bilans urodynamiczny w ginekologii stosuje się w przypadku:

- A. zespołu bólowego miednicy mniejszej,
- B. zaburzenia statyki narządu rodnego z wysiłkowym nietrzymaniem moczu,
- C. lewostronnego ustawienia macicy z nadmiernym przodozgięciem,
- D. umocowania w tyłozgięciu i tyłopochyleniu macicy.

**Zadanie 84.**

Jakie zmiany na skórze najczęściej obserwuje się u kobiety, która nie opuszczała łóżka z powodu choroby nowotworowej narządu rodnego?

- A. odparzenia,
- B. owrzodzenia,
- C. odleżyny,
- D. wyprzenia.

**Zadanie 85.**

Pochwica uniemożliwia odbywanie stosunków:

- A. pochwowych,
- B. przedsionkowych,
- C. analnych,
- D. wszelkich stosunków płciowych.

**Zadanie 86.**

Ze względu na wrażliwość raka trzonu macicy na hormony można uzyskać cofnięcie się przerzutów poprzez stosowanie:

- A. gestagenów,
- B. estrogenów i androgenów,
- C. estrogenów i gestagenów,
- D. androgenów.

**Zadanie 87.**

Czy możliwe jest, aby kobieta po całkowitym usunięciu macicy osiągnęła orgazm w czasie stosunku płciowego?

- A. niemożliwe, ponieważ niemożliwe jest wtedy współzycie płciowe,
- B. niemożliwe, ponieważ przeciwwskazane jest wtedy współzycie płciowe,
- C. możliwe, jeżeli wcześniej też osiągała orgazm,
- D. możliwe, ale bardzo trudne i niebezpieczne.



**Zadanie 88.**

Czas pomiędzy zakażeniem wirusem HIV, a pojawieniem się wykrywalnych w diagnostyce serologicznej przeciwciał wynosi:

- A. ok 3 tygodnie,
- B. ok 6 tygodni,
- C. ok 6 miesięcy,
- D. ok 3 miesiące.

**Zadanie 89.**

U kobiet, u których wynik testu BRCA1 jest pozytywny i obecna jest mutacja genu wykonuje się badania profilaktyczne od:

- A. 25 roku życia,
- B. 30 roku życia,
- C. 35 roku życia,
- D. 40 roku życia.

**Zadanie 90.**

Stosowanie estrogenowej terapii zastępczej zwiększa ryzyko zachorowania na raka:

- A. endometrium,
- B. pochwy,
- C. jajowodów,
- D. sromu.

**Zadanie 91.**

Położna, która NIE wykonuje zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat, a zamierza podjąć jego wykonywanie ma obowiązek odbyć przeszkolenie, trwające nie dłużej niż:

- A. 1 miesiąc,
- B. 3 miesiące,
- C. 6 miesięcy,
- D. 1 rok.

**Zadanie 92.**

Stan napięcia seksualnego u ludzi wyzwalany jest głównie przez zmysł:

- A. wzroku,
- B. słuchu,
- C. smaku,
- D. węchu.

**Zadanie 93.**

W czasie stosowania hormonalnej terapii zastępczej (HTZ) kobieta powinna wykonywać następujące badania:

- A. mammografię, ultrasonografię piersi,
- B. ultrasonografię dopochwową,
- C. oznaczenie całkowitego cholesterolu, stężenia hormonów we krwi,
- D. wszystkie wymienione.

**Zadanie 94.**

Co to są protoonkogeny?

- A. substancje chemiczne mogące być przyczyną nowotworu, np. nikotyna,
- B. geny ludzkie produkujące białka regulatorowe, których mutacja może spowodować powstanie nowotworu,
- C. geny wirusa powodującego nowotwór,
- D. komórkowe modele nowotworów używane przez naukowców do badań.

**Zadanie 95.**

Ektopia jest to:

- A. rak szyjki macicy,
- B. stan przedrakowy,
- C. rak przedinwazyjny,
- D. zmiana parafizjologiczna szyjki macicy.

**Zadanie 96.**

Bezwzględny przeciwwskazaniem do wykonania histeroskopii są/jest:

- A. mięśniaki macicy,
- B. macica z przegrodą,
- C. zapalenie przydatków,
- D. obecność wkładki wewnątrzmacicznej.

**Zadanie 97.**

W pierwszej kolejności, człowiek osiąga dojrzałość:

- A. seksualną,
- B. społeczną,
- C. biologiczną,
- D. uczuciową.

**Zadanie 98.**

Histerosalpingografia polega na:

- A. wprowadzeniu do macicy przyrządu umożliwiającego obejrzenie jej wnętrza i stwierdzeniu jej stanu,
- B. wprowadzeniu do macicy i jajowodów środka cieniującego i uwidocznieniu ich na zdjęciach rentgenowskich,
- C. pobraniu z macicy materiału do badania histopatologicznego przy użyciu specjalnej aparatury,
- D. oglądaniu w powiększeniu błony śluzowej macicy, co pozwala na stwierdzenie lub wykluczenie jej stanów patologicznych.

**Zadanie 99.**

Co to jest torbiel skórzasta?

- A. nowotwór złośliwy,
- B. nowotwór niezłośliwy,
- C. stan przedrakowy,
- D. przerzut nowotworu złośliwego.

**Zadanie 100.**

Leki przeciwpsychotyczne mogą powodować dysfunkcje seksualne w wielu mechanizmach, takich jak:

- A. blokada receptorów D2,
- B. podwyższenie stężenia prolaktyny,
- C. wpływ na receptory serotoninerdyczne,
- D. wszystkie powyższe.

**Zadanie 101.**

W zapłodnieniu pozaustrojowym zarodek umieszcza się:

- A. bezpośrednio w macicy,
- B. w szyjce macicy,
- C. w pochwie,
- D. w jajnikach.

**Zadanie 102.**

Posiadana wiedza na temat zespołu Lyncha wskazuje na konieczność wdrożenia specjalistycznej opieki profilaktyczno-diagnostycznej i leczniczej dla rodzin, a u kobiet dodatkowo zaleca się:

- A. coroczne badanie mammograficzne,
- B. rezonans magnetyczny piersi i coroczne badanie ginekologiczne,
- C. nie wykonuje się żadnych dodatkowych badań,
- D. coroczne badanie ginekologiczne z dopochwowym badaniem ultrasonograficznym i w przypadku przerostu błony śluzowej mięśnia macicy badanie histopatologiczne wyskrobin z trzonu macicy.

**Zadanie 103.**

Kapacytacja definiowana jako przemiana zachodząca w plemniku po wytrysku, pozwala mu dokonać zapłodnienia i rozpoczyna się:

- A. po zagęszczeniu ochronnie działającej plazmy nasienia, do czego zwykle dochodzi w kanale szyjki pod wpływem śluzu,
- B. po zagęszczeniu ochronnie działającej plazmy nasienia, do czego najczęściej dochodzi w jamie macicy,
- C. po usunięciu ochronnie działającej plazmy nasienia, do czego najczęściej dochodzi w kanale szyjki pod wpływem śluzu,
- D. po usunięciu ochronnie działającej plazmy nasienia, do czego najczęściej dochodzi w pochwie pod wpływem śluzu.

**Zadanie 104.**

W okresie andropauzy występuje niedobór:

- A. estrogenów,
- B. androgenów,
- C. folitropiny (FSH),
- D. lutropiny (LH).

**Zadanie 105.**

W ostatnim okresie zaawansowanej choroby nowotworowej najważniejsze to:

- A. zwalczanie bólu,
- B. rehabilitacja,
- C. profilaktyka odleżyn,
- D. zapobieganie przerzutom.

**Zadanie 106.**

Czy można leczyć chemioterapią kobiety w ciąży?

- A. tak, w większości przypadków,
- B. tylko, gdy pacjentka leczona jest analogami zasad purynowych,
- C. tak, gdy kobieta jest leczona metotreksatem lub 6-MP,
- D. nie.

**Zadanie 107.**

Która kolejność czynności wykonywanych u chorych przed zabiegiem operacyjnym jest prawidłowa?

- A. prysznic, enema, premedykacja,
- B. premedykacja, enema, prysznic,
- C. prysznic, premedykacja, enema,
- D. enema, prysznic, premedykacja.

**Zadanie 108.**

Zapalenie przydatków występuje najczęściej u:

- A. kobiet w okresie dojrzałości,
- B. kobiet w okresie okołomenopauzalnym,
- C. dziewcząt tuż przed menarcho,
- D. dziewczynek w okresie pokwitania.

**Zadanie 109.**

Najczęściej występującymi nowotworami jajnika są guzy:

- A. endometrialne,
- B. śluzowe,
- C. surowicze,
- D. Brennera.

**Zadanie 110.**

Leczenie chirurgiczne w przypadku nawrotowego raka jajnika jest:

- A. metodą z wyboru,
- B. stosowane, gdy guz nie nacieka sąsiednich tkanek,
- C. stosowane u niektórych chorych i ma charakter paliatywny,
- D. uzupełniającym leczeniem po chemioterapii.

**Zadanie 111.**

Aseksualnością jest:

- A. brak pociągu seksualnego do partnera tej samej płci,
- B. brak pociągu seksualnego do partnera przeciwnej płci,
- C. uznawanie siebie za osobę nieatrakcyjną seksualnie,
- D. brak pociągu seksualnego do partnera tej samej i/lub przeciwnej płci, brak potrzeb seksualnych, pożądania.

**Zadanie 112.**

W okresie dojrzewania dziewcząt źródłem krążących we krwi estrogenów są:

- A. jajniki,
- B. jajniki i tkanka tłuszczowa,
- C. tkanka tłuszczowa,
- D. tkanka mięśniowa.

**Zadanie 113.**

Który lek NIE należy do cytostatyków?

- A. 6-merkaptopuryna,
- B. 5-fluorouracyl,
- C. Acyklowir,
- D. Metotreksat.

**Zadanie 114.**

Wczesny objaw popromienny występujący w leczeniu radioterapią szyjki macicy to:

- A. wymioty,
- B. wypadanie owłosienia łonowego,
- C. przetoka pęcherzowo- pochwowa,
- D. krwawienie z błon śluzowych.

**Zadanie 115.**

Indeks funkcji seksualnych kobiet, będący instrumentem samooceny wszystkich domen żeńskich funkcji seksualnych to:

- A. IIEF,
- B. MFSQ,
- C. FSFI,
- D. PFSF.

**Zadanie 116.**

Zakażenie noworodka wirusem HIV prowadzi do ciężkich zaburzeń układu:

- A. oddechowego,
- B. pokarmowego,
- C. immunologicznego,
- D. krążenia.

**Zadanie 117.**

Jak można stwierdzić, czy dana osoba jest "superkobietą"?

- A. badaniem wzrokowym,
- B. badaniem kariotypu lub ciała Barra,
- C. wyłącznie badaniem kariotypu,
- D. wyłącznie badaniem chromatyny płciowej.

**Zadanie 118.**

Czym się charakteryzuje macica noworodka?

- A. długość szyjki macicy jest 2 x większa niż trzonu,
- B. trzon jest 2 x dłuższy niż szyjka,
- C. trzon jest ruchomy w stosunku do szyjki,
- D. trzon i szyjka są tej samej długości.

**Zadanie 119.**

Posługując się metodą termiczną, kobieta może określić w cyklu miesięczkowym:

- A. początek i koniec okresu płodności,
- B. tylko początek okresu płodności,
- C. tylko koniec okresu płodności,
- D. nie może wyznaczyć w ogóle okresu płodności.

**Zadanie 120.**

Ekshibicjonizm to:

- A. potrzeba ekspozycji narządów płciowych obcym, nieoczekującym tego osobom,
- B. potrzeba ekspozycji narządów płciowych dzieciom,
- C. rodzaj zaburzenia osobowości, charakteryzujący się potrzebą koncentracji uwagi otoczenia na sobie,
- D. skłonność do obnażania się za pieniądze (np. striptease).

**Zadanie 121.**

Faza utajonego zakażenia wirusem HIV:

- A. występuje w pierwszych tygodniach zakażenia,
- B. to okres trwający lata, w którym mechanizmy odpornościowe skutecznie kontrolują stężenie wirusii HIV,
- C. okres w którym dochodzi do przełamania sił obronnych organizmu i pojawienia się objawów zakażenia HIV,
- D. odpowiedzi A i B są prawidłowe.

**Zadanie 122.**

Dlaczego okres noworodkowy nazywa się przełomowym z punktu widzenia hormonów?

- A. dziecko jest pod wpływem estrogenów matczynych,
- B. pęcherzyki jajnikowe dziecka produkują estrogeny,
- C. brak w organizmie dziecka hormonów płciowych,
- D. zaznacza się już wpływ progesteronu.

**Zadanie 123.**

W jakim stadium podziału, w przypadku zapłodnienia pozaustrojowego, zapłodniona komórka jajowa jest przenoszona do jamy macicy?

- A. zygoty,
- B. blastocysty,
- C. moruli,
- D. oocyty.

**Zadanie 124.**

Nasienie męskie w banku spermy jest przechowywane w temperaturze:

- A.  $-196,5^{\circ}\text{C}$ ,
- B.  $0^{\circ}\text{C}$ ,
- C.  $+4^{\circ}\text{C}$ ,
- D.  $+35^{\circ}\text{C}$ .

**Zadanie 125.**

Czy polskie położne, będące członkami Polskiego Towarzystwa Położnych, mogą należeć do Międzynarodowego Stowarzyszenia Położnych?

- A. tak,
- B. tak, pod warunkiem złożenia stosownej deklaracji i dokonania wpłaty składki członkowskiej,
- C. tak, pod warunkiem złożenia egzaminu ze znajomości języka angielskiego,
- D. nie, polskie położne nie mogą należeć do Europejskiego Stowarzyszenia Położnych.

**Zadanie 126.**

Pęknięcie ropnia jajowodowo - jajnikowego to powikłanie przebiegu:

- A. ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego,
- B. pękniętej ciąży ekotopowej,
- C. pękniętej torbieli jajnika,
- D. ostrego zapalenia przydatków.

**Zadanie 127.**

Jatrogenne zapalenie błony śluzowej macicy powstaje wskutek:

- A. długotrwałego stresu,
- B. wewnątrzmacicznego zabiegu,
- C. wtargnięcia zakażenia z kanału szyjki,
- D. obecności mięśniaków podśluzówkowych.

**Zadanie 128.**

Impotencja jest to:

- A. zmniejszenie potrzeb seksualnych,
- B. niezdolność mężczyzny do odbycia stosunku seksualnego,
- C. opóźniony wytrysk,
- D. przedwczesny wytrysk.

**Zadanie 129.**

Reakcję erotyczną u kobiety trudno jest osiągnąć dotykając:

- A. okolice pochwy,
- B. wargi sromowe większe,
- C. wargi sromowe mniejsze,
- D. szyjkę macicy.



**Zadanie 130.**

Pojawienie się owłosienia łonowego i pachowego u dziewczynek jest uwarunkowane działaniem:

- A. estrogenów jajnikowych,
- B. hormonów gonadotropowych przysadki,
- C. androgenów nadnerczowych i jajnikowych,
- D. hormonu somatotropowego.

**Zadanie 131.**

Gdy w trakcie leczenia nowotworu szyjki macicy pojawiają się objawy popromienne należy:

- A. zredukować dawkę promieniowania o 50%,
- B. natychmiast zmienić leczenie na chemioterapię,
- C. stosować leczenie objawowe objawów popromiennych,
- D. odczekać - po zakończeniu leczenia te objawy ustąpią.

**Zadanie 132.**

Stwierdzenie obecności zmian grupy CIN II i CIN III jest wskazaniem do:

- A. powtórzenia badania kolposkopowego,
- B. pobrania wycinków celowanych i łyżeczkowania kanału szyjki,
- C. podania leczenia przeciwzapalnego,
- D. wykonania ultrasonografii.

**Zadanie 133.**

Największe znaczenie w rozpoznaniu raka endometrium ma pobranie materiału do badania metodą:

- A. aspiracji z jamy macicy,
- B. płukania jamy macicy,
- C. wyłyżeczkowania jamy macicy,
- D. wymazu z ujścia szyjki macicy.

**Zadanie 134.**

Częstość występowania raka endometrium macicy u kobiet zwiększa się po:

- A. 30 roku życia,
- B. 40 roku życia,
- C. 50 roku życia,
- D. 60 roku życia.

**Zadanie 135.**

Czy rzesistek pochwoy może kolonizować tylko pochwę?

- A. tak, nie dotyczy innych narządów,
- B. w zależności od odmiany rzesistka,
- C. kolonizuje też cewkę moczową i pęcherz moczowy,
- D. kolonizuje sąsiedztwo: cewkę moczową i odbył.